



ARTÍCULO ESPECIAL

Asesoramiento genético en pediatría: implicaciones clínicas y desafíos en la medicina genómica

Diana Salinas Chaparro^{a,1}, Patricia Muñoz Cabello^{b,*1}, Gema Escribano Serrano^a, Maite Torres López^b, Eduardo F. Tizzano^b, Antonio F. Martínez-Monseny^a y Fernando Santos-Simarro^c

^a Servicio de Genética Clínica y Molecular, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España

^b Área de Genética Clínica y Molecular, Hospital Universitario Vall d'Hebrón, Barcelona, España

^c Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España

Recibido el 18 de octubre de 2024; aceptado el 30 de mayo de 2025

PALABRAS CLAVE

Medicina genómica;
Asesoramiento
genético, Pediatría,
Infancia;
Adolescencia;
Comunicación

Resumen La medicina genómica ha avanzado significativamente, impulsada por las tecnologías genómicas y su integración en la práctica clínica. Sin embargo, su implementación presenta desafíos, especialmente en el asesoramiento genético (AG) y en la interpretación de datos genómicos. El AG es un proceso de comunicación no directivo que busca ayudar a pacientes y familiares a entender y adaptarse a las implicaciones de un diagnóstico genético. En pediatría, el AG adquiere una relevancia particular, adaptándose a las necesidades de cada etapa del desarrollo infantil. Durante el periodo neonatal, se enfrentan retos en pruebas de cribado y diagnóstico rápido en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN). En la infancia, el AG se centra en la comunicación con el paciente menor y su familia, abordando temas éticos complejos como el consentimiento, los estudios predictivos y los hallazgos incidentales. En la adolescencia se plantean retos en relación con su autonomía y la toma de decisiones. La atención multidisciplinar es clave, incluyendo casos sin diagnóstico a lo largo de la conocida «odisea diagnóstica». Este artículo revisa el rol del AG en las diferentes etapas de la atención pediátrica en el contexto de los estudios genómicos actuales.

© 2025 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: patricia.munoz@vallhebron.cat (P. Muñoz Cabello).

¹ Este artículo ha sido coescrito por Patricia Muñoz y Diana Salinas, quienes han contribuido de manera equitativa en su elaboración como autoras principales.

<https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2025.503929>

1695-4033/© 2025 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

KEYWORDS

Genomic medicine;
Genetic counseling;
Pediatrics;
Childhood;
Adolescence;
Communication

Genetic counseling in pediatrics: Clinical implications and challenges in genomic medicine

Abstract Genomic medicine has made significant progress, driven by genomic technologies and their integration into clinical practice. However, its implementation presents challenges, particularly in genetic counseling (GC) and the interpretation of genomic data. Genetic counseling is a nondirective communication process aimed at helping patients and families understand and adapt to the implications of a genetic diagnosis. In pediatric care, GC takes on particular importance, adapting to the needs of each child development stage. Challenges arise with genetic newborn screening and rapid tests in intensive care units (ICUs) during the neonatal period. In children, GC focuses on the communication with the young patient and their family, addressing complex ethical issues such as consent, predictive testing and incidental findings. In adolescents, new challenges arise in relation to autonomy and decision-making. Multidisciplinary care is essential, including yet undiagnosed cases still on the journey commonly referred to as the 'diagnostic odyssey'. This article reviews the role of GC across the stages of paediatric care in the framework of the current evidence on genomics.

© 2025 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introducción

Actualmente, lo que conocemos como medicina genómica viene determinado por los grandes avances en las tecnologías, su integración en la práctica clínica y su rol central en la atención médica de los pacientes. Su implementación enfrenta ciertos desafíos, entre los que destacan las dificultades relacionadas con el asesoramiento genético (AG) y la interpretación de los datos genómicos.

El AG se define como un proceso de comunicación no directivo cuya finalidad es ayudar a los pacientes, parejas y familiares que presentan un trastorno genético, a comprender y adaptarse a las implicaciones médicas, psicológicas, reproductivas y familiares de este¹. A pesar de que el AG no siempre implica la realización de una prueba genética, el proceso de asesoramiento es una parte fundamental durante la realización de una prueba genética, como el exoma o genoma.

En el entorno pediátrico, distintos aspectos del AG cobran especial importancia y adquieren una dimensión especial que difiere de la atención médica en individuos adultos. Desde el periodo neonatal, pasando por el diagnóstico genético en las etapas de primera y segunda infancia hasta la adolescencia, en este artículo se revisa el papel del AG a lo largo de todas ellas, centrado en la atención dentro de equipos multidisciplinares y en el contexto actual de los estudios genómicos.

El asesoramiento genético en las etapas de la pediatría

El proceso de diagnóstico genético en pacientes pediátricos tiene características especiales en cada etapa de su desarrollo, y el papel del AG se adapta a las necesidades particulares de cada momento (fig. 1). Por ejemplo, en el periodo neonatal se plantean retos únicos con las pruebas de cribado, que se dirigen hacia la incorporación de estu-

dios genéticos como primer abordaje, así como en el AG en el proceso de diagnóstico rápido en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN)^{2,3}. A lo largo de la infancia el proceso de AG se centra principalmente en la comunicación y acompañamiento del paciente menor de edad y sus progenitores/tutores y se adapta a un modelo centrado en la familia (*Family Centred Counselling*)⁴. Las necesidades e intereses parentales pueden sumarse o interferir con los del menor, y en ocasiones, temas como el consentimiento/asesentamiento, hallazgos no relacionados con el motivo de estudio (hallazgos incidentales o secundarios), y estudios genéticos en casos asintomáticos (estudios predictivos) adquieren una dimensión ética compleja^{5,6}. La comunicación con el paciente pediátrico y adolescente, y cómo las consultas de AG se plantean durante las diferentes etapas, hacen que el rol del asesor genético adquiera una dimensión particular y requiera de conocimientos y habilidades específicas.

Durante estas etapas, la atención multidisciplinar de los equipos integrados por genetistas clínicos, asesores genéticos, gestores de pacientes y otros especialistas es crucial para el diagnóstico y el acompañamiento de las familias.

Etapa neonatal

Cribado neonatal

El cribado neonatal permite la detección temprana y la identificación de enfermedades tratables en los recién nacidos a partir de un marcador bioquímico, a menudo antes de que los síntomas aparezcan. Se trata de una medida de salud pública de prevención secundaria que permite una intervención rápida para reducir la morbilidad, la mortalidad y las complicaciones potencialmente graves asociadas⁷. No obstante, existen numerosas enfermedades que no disponen de un marcador bioquímico específico para las que una detección precoz podría cambiar el pronóstico y tratamiento y que podrían ser diagnosticadas mediante un estudio genético.




Figura 1 Particularidades del asesoramiento genético en el contexto del diagnóstico genómico en distintas etapas del seguimiento y atención pediátrica. AG: Asesoramiento genético; UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales.

Durante los últimos años, ha habido iniciativas para incorporar la secuenciación genómica (SG) en los programas de cribado neonatal y su implementación enfrenta ciertos desafíos a nivel médico-asistencial, bioético, social y familiar que deben evaluarse de forma previa a su posible incorporación^{3,6,8,9}. Estudios de investigación a nivel internacional han explorado aspectos relacionados con el posible impacto y las actitudes de los progenitores respecto a la aplicación de la SG en el cribado neonatal, revelando una aceptación de la mayoría de ellos. Sin embargo, existen diferentes preferencias de las familias sobre qué tipos de resultados desearían conocer, desde información de enfermedades de inicio en la infancia prevenibles o tratables hasta enfermedades de inicio en la edad adulta sin tratamiento ni prevención. Muchos de estos proyectos reflejan las inquietudes de los progenitores, reflejan la necesidad de incluir un consentimiento informado previo a la prueba, así como un adecuado AG¹⁰⁻¹². Por ello, a día de hoy, todavía son necesarios datos adicionales que exploren el rol del AG en este ámbito, las necesidades de las familias, así como las implicaciones éticas y asistenciales de incorporar la SG en los programas de salud pública.

Diagnóstico rápido en UCIN

Cuando consideramos uno de los primeros momentos claves en los que se puede realizar un diagnóstico genético en un recién nacido, está aquel relacionado con la valoración durante el ingreso en una UCIN. Este escenario particular, en el que hay una alta gravedad y urgencia para la toma de decisiones clínicas, propone distintos retos a la hora de plantear un AG con la familia^{2,13}.

Uno de los elementos importantes en AG para la construcción del vínculo y comunicación (*rapport*) con el paciente y su familia es cuidar las características del ambiente y ritmo de la consulta. El entorno de una UCIN puede estar muy medicalizado e ir acompañado de interrupciones por otros miembros del equipo clínico. Generalmente, debido a

los espacios en los que se realiza la intervención de AG, las conversaciones con la familia pueden tener lugar de pie o al lado de la cama del paciente. Habitualmente, se trata de una interacción rápida, con tiempo limitado para la comunicación y preparación del caso antes de la visita. Este hecho contrasta con la práctica habitual en las consultas de genética, en las que se dedica un mayor tiempo a recopilar información a través de la revisión del historial médico y de la literatura, así como a contactar con los médicos referentes^{13,14}.

Incluso considerando estos factores, se puede conseguir un asesoramiento efectivo mediante modelos de asesoramiento centrado en momentos de crisis o actuaciones rápidas (fig. 2). Es posible que en esa única intervención no se puedan abordar y explorar algunos aspectos psicosociales y emocionales, pero es importante entonces poder establecer un seguimiento en visitas posteriores^{2,13}.

En este contexto, durante el proceso diagnóstico se suele realizar un análisis en trío (con muestra del paciente y sus progenitores), que va acompañado de una necesidad de anticipar posibles resultados e implicaciones directas para los progenitores o familiares. Aunque ante una situación de gravedad clínica la prioridad de la familia se centre en realizar un estudio que ayude al manejo de las necesidades del recién nacido, es importante informar de manera adecuada de todas las características y limitaciones de la prueba, así como de la posibilidad de hallazgos incidentales^{15,16}.

Infancia

El asesoramiento genético en el proceso diagnóstico

Uno de los aspectos relevantes durante la consulta es la comunicación con el paciente, especialmente cuando se trata de niños/as y/o adolescentes. Ciertas habilidades y




Figura 2 Modelo de asesoramiento genético y valoración psicológica rápida en atención en la unidad de cuidados intensivos. Adaptación de Ayres et al. 2019.¹³.

consideraciones que son transversales en diferentes áreas de la pediatría se pueden adoptar como herramientas para facilitar el AG. Considerar las diferentes etapas del desarrollo social, cognitivo y emocional ([tabla suplementaria](#)) y adaptar tanto las habilidades como las actividades específicas durante las sesiones ayudará en el proceso de comunicación ([fig. 3](#)). Algunas de estas habilidades implican la adaptación del lenguaje a la edad y grado de madurez del menor («hablar el idioma del paciente»). Para ello puede ser útil escuchar con atención qué palabras emplea para definir un determinado concepto y utilizar un vocabulario similar. Por otro lado, usar determinadas actividades dentro de la consulta facilitará que el menor pueda compartir información a través del juego o que pueda experimentar y expresar ciertas emociones mediante dibujos o construcciones¹⁷. En niños/as con alteraciones del neurodesarrollo es imprescindible tener una sensibilidad y consideraciones especiales. Crear un espacio seguro en la consulta en la que el menor obtenga la suficiente confianza para explorar sus sentimientos y permita mostrarse cómo es facilitará el proceso de AG¹⁸.

Asesoramiento genético centrado en la unidad familiar (*Family Centred Counselling*)

Durante el proceso de AG el asesor explora las necesidades médicas, psicosociales y emocionales del paciente y su familia. Sin embargo, en el contexto pediátrico, a veces los límites sobre las necesidades de la familia y los del paciente pueden ser difusos. El asesor tiene un papel complejo y esencial en reconocer, validar y responder a las prioridades de los progenitores que, en ocasiones, entran en conflicto con la protección de la autonomía del menor. Parte del proceso de asesoramiento consiste en intentar encontrar el balance entre los aspectos que influyen en los derechos del menor y dar apoyo a las necesidades de la familia. El *rapport* esta-

blecido durante el proceso es crucial para el desarrollo de una buena relación asesor-paciente/familia junto con otros miembros del equipo médico. Este vínculo y relación establecida permitirá un cuidado centrado en la familia efectivo e individualizado a lo largo de la atención del paciente.

En la interacción con menores y adolescentes es importante recordar que no crecen ni toman decisiones sin influencia de su entorno familiar, ya que forman parte de un sistema de relaciones al que impactarán las decisiones y resultados de un proceso diagnóstico. Puede resultar complejo entender la situación del menor sin considerar el contexto en el que se encuentra y sus dinámicas familiares, por ese motivo se intenta pensar en la familia como unidad en la que centrar la atención como profesionales⁴.

En ocasiones, los deseos de los progenitores al tomar decisiones sobre qué pruebas se realizan a sus hijos/as pueden entrar en conflicto con mantener los estándares de buena práctica clínica en AG¹⁹⁻²². Es común que sientan interés en conocer el estado de portador de sus hijos/as sanos/as, especialmente cuando ya hay un diagnóstico cercano en un familiar. Si bien, generalmente, no se recomienda la realización de estudios genéticos en menores asintomáticos, tiene sentido poder ofrecerlos sólo en los casos de enfermedades de inicio pediátrico en las que hay un beneficio médico en obtener un diagnóstico temprano y existen medidas de intervención. Explorar la motivación de los progenitores para realizar las pruebas, explicar el razonamiento detrás de las recomendaciones profesionales y facilitar un plan para ofrecer pruebas de portador a los hermanos/as cuando puedan tomar una decisión informada puede ayudar a tranquilizarlos. Tener en cuenta la madurez y los deseos del menor, las preocupaciones de los progenitores y las implicaciones para la salud y la reproducción del niño/a serán factores a considerar en el acuerdo que se establezca entre los profesionales y las familias²³.

Es importante no olvidar el rol de los hermanos/as y el efecto del diagnóstico genético para ellos. Algunos autores

Habilidades del profesional durante la consulta

- Saludar, hablar con suavidad, agacharse (en niños pequeños) y mantener el contacto visual
- Según la edad, explicar el motivo de la interacción
- Adaptar el lenguaje, “hablar el idioma del paciente”
- Invitar a que explique lo que recuerda de su clase de ciencias (ej. sobre genética)
- Conocer su nivel de vocabulario
- Escuchar con atención y emplear unas palabras similares
- Empatía, escucha activa y atención
- Adaptarse al lenguaje corporal del niño
- Utilizar brevedad en las respuestas
- Reformular el contenido
- Resumir las explicaciones del niño
- Reflejar sus sentimientos con sencillez
- En el caso de adolescentes, ofrecer la posibilidad para hablar a solas

Actividades para realizar durante la consulta

Utilizar el juego para compartir información:

- Libros o contar una historia. Leer un libro sobre un personaje que es diferente y lucha por integrarse con sus amigos en el colegio. Después de leer la historia, preguntar cómo se siente
- Juego imaginativo. Se le pide al niño que asuma el rol de otra persona (padre o hermano) para enseñarle una situación desde otro punto de vista por ej. con el fin de adquirir conocimiento sobre el comportamiento de los demás. En el caso de adolescentes, el “juego de roles” puede ayudar a enfrentar una situación estresante en un entorno seguro

Utilizar el arte (dibujos o construcciones) para expresar pensamientos/sentimientos. Por ejemplo, puede ser útil proponer que realice un dibujo sobre su enfado, su sueño o su enfermedad. A partir del dibujo, extraer información

Figura 3 Habilidades y actividades específicas útiles durante las consultas de asesoramiento genético¹⁷.

han recogido las experiencias de hermanos/as adolescentes de pacientes con enfermedades minoritarias en las que se resalta el impacto en la construcción de su propia identidad y entre otros los sentimientos de incertidumbre durante el proceso diagnóstico y aspectos sobre el pronóstico futuro²⁴. Los hermanos/as habitualmente son una parte importante y presente durante las visitas clínicas y conversaciones familiares; no atender de manera específica sus dudas o necesidades puede llevar a la malinterpretación y creciente incertidumbre en ellos. Además, durante la adolescencia, y especialmente en la edad adulta, los hermanos/as adoptan generalmente algunas responsabilidades de cuidado y acompañamiento. Parte del rol del asesor genético es capacitar a los progenitores y resaltar la importancia de incluir e informar a los hermanos/as de las implicaciones asociadas a un diagnóstico genético proporcionando el apoyo necesario para atender sus preocupaciones, emociones y dudas^{25,26}.

Adolescencia

La adolescencia es una fase de transición entre la infancia y la adultez²⁷. Durante esta etapa pueden surgir retos en relación con el desarrollo de la autonomía, las relaciones con sus pares, el comportamiento y la toma de decisiones^{28,29}.

En las consultas de AG con adolescentes, uno de los principales retos es establecer un *rapport*, así como identificar y valorar adecuadamente su nivel de madurez, cómo involucrarlos en la consulta y cuándo y cómo incluir a sus progenitores^{18,30}.

Aunque pocos estudios se han enfocado en las perspectivas de los adolescentes en este tema, algunos autores han recogido perspectivas de los adolescentes sobre el AG, analizando factores específicos de esta etapa que emergen durante el diagnóstico de una condición genética. Realizar una toma de contacto previa con el adolescente, ofrecer

D. Salinas Chaparro, P. Muñoz Cabello, G. Escribano Serrano et al.

la opción de realizar consultas individualizadas sin la presencia de sus progenitores, respetar su madurez, adaptar el lenguaje para huir de los paternalismos y normalizar el diagnóstico son algunos de los aspectos a considerar durante la práctica clínica³¹.

El hecho de que los adolescentes perciban una sensación de control y protagonismo en la consulta, decidiendo qué información recibir y quién está presente, ayuda a crear un espacio de confianza que permite la expresión de sentimientos para abordar sus dudas y preocupaciones⁴. En esta etapa es relevante ser conscientes de su papel como interlocutores principales en la comprensión de la información y en la toma de decisiones. En casos en los que el diagnóstico genético se realiza en la infancia, y probablemente el proceso de AG haya estado dirigido a sus progenitores, será relevante asegurar que se pueda retomar ese AG durante esta etapa adolescente y previo a la adultez.

El consentimiento informado

La obtención de consentimiento informado (CI) durante el proceso de un estudio genético tiene características e interlocutores distintos a lo largo de las distintas etapas de la atención pediátrica.

El CI no es tan solo un concepto ético y moral sino también legal, y para que sea verdaderamente informado implica que el paciente tenga capacidad de tomar decisiones, que su elección sea voluntaria y que comprenda la información proporcionada. El paciente, o menor de edad, durante la infancia no será la persona que consienta la realización del estudio genético, sino que serán sus progenitores o tutores legales³².

A pesar de este hecho, es importante tener en consideración la opinión y participación del menor a lo largo de todo el proceso de toma de decisión (asentimiento), considerando su madurez en cada etapa de la infancia en la que se lleve a cabo. En España, según el paradigma del menor maduro (12-15 años), deben firmar el CI los progenitores/tutores junto con el asentimiento del menor. Se considera que la mayoría de edad sanitaria se alcanza a los 16 años, de manera que será entonces cuando el paciente pueda ejercer su autonomía mediante la firma del CI³³.

La expansión del uso de pruebas genéticas, especialmente la SG, ha traído nuevos retos para los profesionales de la salud con respecto al CI. Esto añade complejidad al proceso ante la posibilidad de hallazgos incidentales y una mayor incertidumbre debido a la identificación de variantes de significado clínico incierto¹⁶.

Inevitablemente, la cantidad y complejidad de los resultados genómicos ha aumentado, y esto dificulta poder abordarlos en detalle durante una consulta de AG previa a la realización de la prueba. Una de las principales problemáticas gira en torno a la cantidad adecuada de información y cómo garantizar su comprensión. Aspectos como la reclasificación de variantes, la posibilidad de hallazgos incidentales o secundarios y el circuito de reanálisis de los datos en casos

no diagnosticados juegan un papel principal en la conversación previa a la prueba y obtención del consentimiento.

Los asesores genéticos desempeñan un papel crucial al asistir a los pacientes en la comprensión de los resultados, posibles implicaciones, riesgos y beneficios, así como en el acompañamiento en la incertidumbre y complejidad asociada a las pruebas genómicas. La integración de estos profesionales en equipos multidisciplinares es esencial, especialmente ante la emergente incorporación de los estudios genómicos en la práctica clínica³⁴.

Implicaciones de las pruebas genéticas: hallazgos secundarios, incidentales y estados de portador

Con la incorporación de las técnicas genómicas se ha experimentado una creciente detección de hallazgos de significado clínico incierto, estados de portador de enfermedades recesivas, hallazgos secundarios (cribado oportunista de un listado preestablecido de genes con acción preventiva no relacionados con el motivo de estudio) o incidentales (variantes patogénicas inesperadas en genes que no se buscan activamente).

En el contexto pediátrico, la edad de presentación de las enfermedades asociadas a las variantes encontradas, y si son accionables, son clave para establecer criterios de qué variantes se informan y cuáles no. Existen, sin embargo, diferentes posturas por parte de sociedades científicas en el ámbito de la genética alrededor del mundo en relación con la indicación de búsqueda activa de variantes secundarias o criterios para informar hallazgos incidentales y estados de portador de enfermedades recesivas en menores de edad (**tabla 1**)^{20,35-40}. Actualmente existe poca precisión en relación con el término accionable y la distinción entre hallazgos secundarios e incidentales. La realidad es que, a día de hoy, no existe un consenso a nivel mundial y sigue siendo un tema de gran interés y debate³⁴.

En su documento de recomendaciones, la Sociedad Europea de Genética Humana (ESHG) propone la creación de proyectos e iniciativas que permitan conocer mejor el impacto y percepciones de la posible implementación de un cribado oportunista³⁶.

Existen diferentes estudios realizados al respecto que evalúan el impacto y utilidad de diversos modelos de práctica clínica oportunista en adultos y menores de edad. Diferentes propuestas a modelos de consentimiento y abordaje en la búsqueda de hallazgos secundarios en «dos pasos» o estadios (es decir, tras informar de los hallazgos principales) han sido objeto de algunos proyectos de investigación y han podido contribuir a aportar experiencia y conocimiento a considerar en la revisión de recomendaciones y protocolos futuros de las sociedades científicas^{41,42}.

Ante este contexto, el asesoramiento previo y posterior a la prueba genómica por parte de profesionales especializados es esencial y cobra especial importancia para cualquier paciente que realice una prueba genética.

Tabla 1 Posicionamientos de diferentes sociedades científicas a los hallazgos incidentales, secundarios y estados de portador en estudios genéticos en menores de edad

	Hallazgos secundarios	Hallazgos incidentales	Estados de portador
AEGH ³² <i>(Asociación Española de Genética Humana)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Reconoce la problemática ética y consenso en rechazar su búsqueda activa - En caso de ofrecerse debe contemplarse en el CI y mediante una consulta de AG pretest 	<ul style="list-style-type: none"> - Variantes patogénicas - Genes accionables en edad pediátrica - Evitar genes de enfermedades de aparición en edad adulta no prevenibles/tratables 	<ul style="list-style-type: none"> - Reportar siempre y cuando se haya anticipado información sobre la posibilidad de este hallazgo - Debe contemplarse en el CI
ESHG ³⁶ <i>(European Society of Human Genetics)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Recomienda un análisis dirigido a la indicación clínica - Informar de mutaciones en genes de enfermedades de inicio en edad adulta necesita una valoración ética más exhaustiva - Se acepta la búsqueda de variantes asociadas a condiciones de aparición temprana y accionables 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis dirigido para evitar hallazgos incidentales - Se precisan guías para establecer qué hallazgos deberían informarse - Balance entre la autonomía e intereses del menor vs. derecho de los padres y la familia a conocer información beneficiosa para su salud 	<ul style="list-style-type: none"> - La posibilidad de identificar un estado de portador de manera incidental debería anticiparse durante la visita pretest - Opción de los padres a decidir si quieren o no recibir este resultado
ACMG ³⁷ <i>(American College of Medical Genetics)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda activa de una lista mínima de genes (incluyendo de enfermedades de inicio en edad adulta) - Informar de variantes accionables y en genes de alta penetrancia - Misma consideración en adultos y menores - Posibilidad de escoger pretest (<i>opt in/opt out</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalece el beneficio de informar de variantes accionables para la salud del menor y su familia - Informar de variantes accionables y en genes de alta penetrancia - Posibilidad de escoger pretest (<i>opt in/opt out</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - N/A
AGNC ³⁸ y BSGM ²⁰ <i>(Association of Genetic Nurses and Counsellors- UK)</i> <i>(British Society of Genetic Medicine)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - No se debería ofrecer para enfermedades de inicio en edad adulta - En caso de ofrecerse, debería proporcionarse AG y posibilidad de escoger en el CI (<i>opt in/opt out</i>) - La lista de genes debería consensuarse por un grupo de expertos 	<ul style="list-style-type: none"> - Reportar en función de si son accionables clínicamente, su penetrancia y clasificación de la variante 	<ul style="list-style-type: none"> - No se recomienda informar de estados de portador
SFMPP ³⁹ <i>(Société Française Médecine Prédictive Personnalisée)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Queda pendiente el debate en torno a si se acepta la búsqueda activa de genes de predisposición a cáncer - En caso de ofrecerse se propone un modelo de CI en dos pasos (<i>multistep dynamic consent</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Reportar si son genes accionables - Debe anticiparse esta posibilidad en la visita pretest y durante el CI 	<ul style="list-style-type: none"> - N/A
CCMG ⁴⁰ <i>(Canadian College of Medical Geneticist)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - No se respalda la búsqueda intencionada de genes no relacionados con la indicación primaria - En caso de ofrecerse debe darse la opción de recibir/no recibir estos hallazgos 	<ul style="list-style-type: none"> - La utilidad clínica de muchos IF está todavía por establecerse - Hasta que se precisen los beneficios de reportarlos, junto con datos empíricos, se recomienda una aproximación cautelosa - Reportar únicamente genes accionables durante la infancia - En los genes de expresión en edad adulta no deben comunicarse a excepción de algunos supuestos 	<ul style="list-style-type: none"> - N/A

AG: asesoramiento genético; CI: consentimiento informado; N/A: no disponible.

Conclusión

La incorporación de la medicina genómica en la práctica clínica supone nuevos retos debido al aumento de la complejidad en la interpretación e implicaciones de las pruebas genéticas. Debido a esto, es importante contar con equipos multidisciplinares, incluyendo a asesores genéticos, dedicados a la atención del paciente pediátrico, que acompañen en la toma de decisiones y en la comunicación con el paciente y su familia.

Financiación

No existe financiación.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de intereses.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2025.503929>.

Bibliografía

1. Resta R, Biesecker BB, Bennett RL, Blum S, Hahn SE, Strelak MN, et al. A new definition of genetic counseling: National Society of Genetic Counselors' Task Force report. *J Genet Counsel*. 2006;15:77–83.
2. Kim S, Pistawka C, Langlois S, Osiovich H, Virani A, Kitchin V, et al. Genetic counselling considerations with genetic/genomic testing in Neonatal and Pediatric Intensive Care Units: A scoping review. *Clin Genet*. 2024;105:13–33.
3. Stark Z, Scott RH. Genomic newborn screening for rare diseases. *Nat Rev Genet*. 2023;24:755–66.
4. McGlynn JA, Langfelder-Schwind E. Bridging the gap between scientific advancement and real-world application: Pediatric genetic counseling for common syndromes and single-gene disorders. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2020;10:1–13.
5. Sergi MM, Keinath MC, Fanaroff J, Miller KE. Ethical Considerations of Genome Sequencing for Pediatric Patients. *Semin Pediatr Neurol*. 2023;45:101039.
6. Clarke AJ, Wallgren-Petterson C. Ethics in genetic counselling. *J Community Genet*. 2019;10:3–33.
7. Ministerio de Sanidad. Programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas [Internet]. 2024 [consultado 14 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/cribado/cribadoNeonatal/enfermedadesEndocrinoMetabolicas/home.htm>.
8. Jeanne M, Chung WK. DNA Sequencing in Newborn Screening: Opportunities, Challenges, and Future Directions. *Clin Chem*. 2025;71:77–86.
9. Friedman JM, Cornel MC, Goldenberg AJ, Lister KJ, Séncal K, Years DF. Genomic newborn screening: public health policy considerations and recommendations. *BMC Med Genomics*. 2017;10:9.
10. Moultrie RR, Paquin R, Rini C, Roche MI, Berg JS, Powell CM, et al. Parental Views on Newborn Next Generation Sequencing: Implications for Decision Support. *Matern Child Health J*. 2020;24:856–64.
11. Armstrong B, Christensen KD, Genetti CA, Parad RB, Robinson JO, Blout Zawatsky CL, et al. Parental Attitudes Toward Standard Newborn Screening and Newborn Genomic Sequencing: Findings From the BabySeq Study. *Front Genet*. 2022;13:867371.
12. White S, Mossfield T, Fleming J, Barlow-Stewart K, Ghedia S, Dickson R, et al. Expanding the Australian Newborn Blood Spot Screening Program using genomic sequencing: do we want it and are we ready? *Eur J Hum Genet*. 2023;31:703–11.
13. Ayres S, Gallacher L, Stark Z, Brett GR. Genetic counseling in pediatric acute care: Reflections on ultra-rapid genomic diagnoses in neonates. *J Genet Couns*. 2019;28:273–82.
14. Stark Z, Lunke S, Brett GR, Tan NB, Stapleton R, Kumble S, et al. Meeting the challenges of implementing rapid genomic testing in acute pediatric care. *Genet Med*. 2018;20:1554–63.
15. Bowdin S, Gilbert A, Bedoukian E, Carew C, Adam MP, Belmont J, et al. Recommendations for the integration of genomics into clinical practice. *Genet Med*. 2016;18:1075–84.
16. Patch C, Middleton A. Genetic counselling in the era of genomic medicine. *Br Med Bull*. 2018;126:27–36.
17. Austin S, Schoch K. Developmentally Based Approaches for Counseling Children and Adolescents. En: *Genetic Counseling Practice: Advanced Concepts and Skills*. 2.^a ed. John Wiley and SonsLtd; 2021. p. 191–214.
18. Griswold CM, Ashley SS, Dixon SD, Scott JL. Genetic counselors' experiences with adolescent patients in prenatal genetic counseling. *J Genet Couns*. 2011;20:178–91.
19. Hercher L. Discouraging elective genetic testing of minors: A norm under siege in a new era of genomic medicine. *Cold Spring Harb Perspect Biol*. 2020;10:a036657.
20. Royal College of Physicians RC of P and BS for GM. Genetic testing in childhood. Guidance for clinical practice [Internet]. London; 2022. Disponible en: www.rcp.ac.uk.
21. Borry P, Evers-Kiebooms G, Cornel MC, Clarke A, Dierickx K. Genetic testing in asymptomatic minors: Background considerations towards ESHG Recommendations. *Eur J Hum Genet*. 2009;17:711–9.
22. National Society of Genetic Counselors. Genetic Testing of Minors for Adult-Onset Conditions. Position Statement NSGC [Internet]. Disponible en: <https://www.nsgc.org/POLICY/Position-Statements/Position-Statements/Post/genetic-testing-of-minors-for-adult-onset-conditions>.
23. Years DF, Metcalfe SA. Carrier testing in children and adolescents. *Eur J Med Genet*. 2015;58:659–67.
24. Heaton J, Wainstein T, Elliott AM, Austin J. The experiences of adolescent siblings of children with rare genetic conditions: "It's made me who I am.". *J Genet Couns*. 2023;32:224–34.
25. Vatne TM, Helmen IØ, Bahr D, Kanavin Ø, Nyhus L. "She Came out of mum's Tummy the Wrong way" (Mis) Conceptions Among Siblings of Children with Rare Disorders. *J Genet Couns*. 2015;24:247–58.
26. Turnwald A, Thompson T, Nori K, Duis J. Communication practices of parents and unaffected sibling needs in families impacted by a diagnosis of Angelman syndrome. *Am J Med Genet A*. 2022;188:2110–8.
27. Organización Mundial del la Salud (OMS). Salud del adolescente [Internet]. 2024 [consultado 14 Oct 2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1.
28. Sawyer SM, Afifi RA, Bearinger LH, Blakemore SJ, Dick B, Ezeh AC, et al. Adolescence: A foundation for future health. *Lancet*. 2012;379:1630–40.
29. McDonagh JE, Ambresin AE, Boisen KA, Fonseca H, Jakobsson Kruse P, Meynard A, et al. The age of adolescence...and young adulthood. *The Lancet Child and Adolescent Health*. 2018;2:e6.
30. Tse C, Sahhar M, Wallace J, Duncan RE. There's a whole different way of working with adolescents: Interviews with australian genetic counselors about their experiences with adolescent clients. *J Genet Couns*. 2013;22:674–84.

31. Pichini A, Shuman C, Sappleton K, Kaufman M, Chitayat D, Babul-Hirji R. Experience with genetic counseling: the adolescent perspective. *J Genet Couns.* 2016;25:583–95.
32. T. Pàmpols JMGSAPAAD de B. Consulta acerca de la secuenciación del exoma con fines diagnósticos en menores. 2020.
33. Jefatura del Estado. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE núm. 274, de 15/11/2002 BOE-A-2002-22188; 2023.
34. Santos Simarro F. Advances in clinical genetics and its current challenges. *An Pediatr (Engl Ed).* 2022;97:281.e1–5.
35. Pàmpols Ros T, Pérez Aytés A, Miguel García Sagredo J, Díaz de Bustamante A, Blanco Guillermo I. Cribado neonatal genómico. Perspectiva de la Comisión de Ética de la Asociación Española de Genética Humana. Parte I. Las tecnologías de secuenciación masiva (NGS) y su aplicación al cribado neonatal. Desafíos y oportunidades [Internet]. Disponible en: <https://ojs.sanidad.gob.es/index.php/resp/article/view/270>.
36. De Wert G, Dondorp W, Clarke A, Dequeker EMC, Cordier C, Deans Z, et al. Opportunistic genomic screening. Recommendations of the European Society of Human Genetics. *Eur J Hum Genet.* 2021;29:365–77.
37. Miller DT, Lee K, Abul-Husn NS, Amendola LM, Brothers K, Chung WK, et al. ACMG SF v3.2 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genet Med.* 2023;25:100866.
38. Middleton A, Patch C, Wiggins J, Barnes K, Crawford G, Benjamin C, et al. Position statement on opportunistic genomic screening from the Association of Genetic Nurses and Counselors (UK and Ireland). *Eur J Hum Genet.* 2014;22:955–6.
39. Pujol P, Vande Perre P, Faivre L, Sanlaville D, Corsini C, Baertschi B, et al. Guidelines for reporting secondary findings of genome sequencing in cancer genes: the SFMPP recommendations. *Eur J Hum Genet.* 2018;26:1732–42.
40. Boycott K, Hartley T, Adam S, Bernier F, Chong K, Fernandez BA, et al. The clinical application of genome-wide sequencing for monogenic diseases in Canada: Position statement of the Canadian College of medical geneticists. *J Med Genet.* 2015;52:431–7.
41. Codina-Solà M, Trujillano L, Abulí A, Rovira-Moreno E, Muñoz-Cabello P, Campos B, et al. An Spanish study of secondary findings in families affected with mendelian disorders: choices, prevalence and family history. *Eur J Hum Genet.* 2023;31:223–30.
42. Martyn M, Lee L, Jan A, Lynch E, Weerasuriya R, Kanga-Parabia A, et al. Evaluation of a two-step model of opportunistic genomic screening. *Eur J Hum Genet.* 2024;32:656–64.