



ORIGINAL

## Perfil de sensibilización alérgica en niños de 0 a 5 años con sibilancias o dermatitis atópica

I. Carvajal Urueña<sup>a,\*</sup>, C. Díaz Vázquez<sup>b</sup>, A. Cano Garcinuño<sup>c</sup>, A. García Merino<sup>d</sup>, J.J. Morell Bernabé<sup>e</sup>, J.M. Pascual Pérez<sup>f</sup>, A. Jiménez Cortés<sup>g</sup>, J. Blanco González<sup>h</sup>, J.L. Montón Álvarez<sup>i</sup>, X. Pérez Porcuna<sup>j</sup>, M.J. Torregrosa Bertet<sup>k</sup>, M. Callén Blecuá<sup>l</sup> y Grupo de Estudio Aplicaciones de Phadiatop infant<sup>®</sup> en la Alergia Infantil (APiA)<sup>♦</sup>

<sup>a</sup>Centro de Salud La Ería, Oviedo, Asturias, España

<sup>b</sup>Centro de Salud de Moreda de Aller, Asturias, España

<sup>c</sup>Centro de Salud de Villamuriel del Cerrato, Palencia, España

<sup>d</sup>Centro de Salud Vallobín - La Florida, Oviedo, Asturias, España

<sup>e</sup>Centro de Salud de Bancarrota, Badajoz, España

<sup>f</sup>Centro de Salud Juan de la Cierva, Getafe, Madrid, España

<sup>g</sup>Centro de Salud Montequinto, Sevilla, España

<sup>h</sup>Centro de Salud Reyes Magos, Alcalá de Henares, Madrid, España

<sup>i</sup>Centro de Salud Mar Báltico, Madrid, España

<sup>j</sup>Centro de Salud de Santa Eugenia de Berga, Barcelona, España

<sup>k</sup>Centro de Salud La Mina, Barcelona, España

<sup>l</sup>Centro de Salud Bidebieta, San Sebastián, Guipuzcoa, España

Recibido el 14 de junio de 2009; aceptado el 28 de septiembre de 2009

Disponible en Internet el 27 de noviembre de 2009

### PALABRAS CLAVE

Sibilancias;  
Dermatitis atópica;  
Sensibilización alérgica;  
Lactantes;  
Preescolares

### Resumen

**Antecedentes:** Aunque las enfermedades alérgicas son frecuentes en la infancia, pocos estudios han caracterizado el perfil de sensibilización inmunoglobulina (Ig) E en niños pequeños con síntomas de posible origen alérgico.

**Objetivo:** Establecer la prevalencia y el tipo de sensibilización alérgica, y los factores demográficos y ambientales relacionados con ambas características, en niños de 0 a 5 años de edad con sibilancias o dermatitis atópica.

**Población y métodos:** Estudio transversal colaborativo en el que participaron 20 centros de atención primaria de diversas áreas geográficas de España. En conjunto, 468 niños con sibilancias o dermatitis atópica realizaron una evaluación alergológica que incluyó la determinación en sangre de anticuerpos IgE específicos frente a neumalérgenos y trofoalérgenos prevalentes.

\*Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: icarvajalu@telefonica.net, ignacio.carvajal@sespa.princast.es (I. Carvajal Urueña).

♦El listado de los miembros de Grupo del Estudio Aplicaciones de Phadiatop infant<sup>®</sup> en la Alergia Infantil (APiA) se presenta en el Anexo I.

**Resultados:** Se detectó sensibilización alérgica en el 32,4% de los niños con sibilancias (intervalo de confianza [IC] del 95%: 26,3–38,6%), el 54,8% de los niños con dermatitis atópica (IC del 95%: 42,1–67,6%) y el 39,2% de los que tuvieron ambos procesos (IC del 95%: 32,0–46,4%). El riesgo de sensibilización se vio influido por el sexo (*odds ratio* ajustado [ $OR_A$ ] masculino versus femenino: 1,91; IC del 95%: 1,24–2,95), la edad ( $OR_A$  3–5 versus 0–2 años: 1,96; IC del 95%: 1,27–3,0), el tipo de lactancia ( $OR_A$  materna versus artificial: 0,51; IC del 95%: 0,31–0,84) y el área geoclimática ( $OR_A$  continental versus atlántica: 2,26; IC del 95%: 1,30–3,93). Con respecto al área atlántica, la sensibilización en el área continental fue menor a ácaros ( $OR_A$ : 0,16; IC del 95%: 0,07–0,36) y mayor a gramíneas ( $OR_A$ : 4,65; IC del 95%: 1,99–10,86), leche de vaca ( $OR_A$ : 5,17; IC del 95%: 1,71–15,62) y huevo ( $OR_A$ : 5,26; IC del 95%: 2,04–13,62), mientras que en el área mediterránea fue menor a ácaros ( $OR_A$ : 0,29; IC del 95%: 0,13–0,64) y mayor a leche de vaca ( $OR_A$ : 3,81; IC del 95%: 1,20–12,14) y huevo ( $OR_A$ : 5,24; IC del 95%: 1,94–14,20).

**Conclusiones:** Una proporción relevante de los niños pequeños asistidos en atención primaria por sibilancias o dermatitis atópica presentan sensibilización alérgica. En España parecen existir variaciones según el área geoclimática en la prevalencia de sensibilización a inhalantes y alimentos en lactantes y niños preescolares con síntomas de posible origen alérgico.

© 2009 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

## KEYWORDS

Wheezing;  
Atopic dermatitis;  
Allergic sensitization;  
Infant;  
Toddlers

## Allergic sensitization profile in 0–5 year old children with wheezing and/or atopic dermatitis

### Abstract

**Background:** Although allergic diseases are frequent in childhood, few studies have characterised the IgE sensitization profile among young children with allergic-like symptoms.

**Objective:** To determine the prevalence and the type of allergic sensitization, as well as the demographic and environmental factors related to both characteristics, among 0–5 year old children presenting with wheezing and/or atopic dermatitis.

**Methods:** Collaborative cross-over study developed in the paediatric setting of 20 Spanish Primary Health Care Centres. An allergology evaluation including blood determination of specific IgE antibodies to common inhalant and food allergens was performed on 468 children who presented with wheezing and/or atopic dermatitis.

**Results:** Allergic sensitization was detected in 32.4% of the children with wheezing (95% confidence interval, 95%CI, 26.3–38.6%), in 54.8% of the children who had atopic dermatitis (95%CI, 42.1–67.6%) and in 39.2% of the children with both processes (95%CI, 32.0–46.4%). The risk of allergic sensitization was sex related (male versus female adjusted *odds ratio*,  $OR_A$ , 1.91, 95%CI, 1.24–2.95), and also related to the age (3–5 versus 0–2 year old  $OR_A$  1.96, 95%CI, 1.27–3.0), type of early feeding (maternal milk versus infant formula  $OR_A$  0.51, 95%CI, 0.31–0.84) and geoclimatic area ( $OR_A$  Continental versus Atlantic 2.26, 95%CI, 1.30–3.93). Compared to the Atlantic area, the Continental area the sensitization was lower to mites ( $OR_A$  0.16, 95%CI, 0.07–0.36) and higher to grass ( $OR_A$  4.65, 95%CI 1.99–10.86), cow milk ( $OR_A$  5.17, 95%CI, 1.71–15.62) and egg ( $OR_A$  5.26, 95%CI, 2.04–13.62), whereas in the Mediterranean area the sensitization was lower to mites ( $OR_A$  0.29, 95%CI, 0.13–0.64) and higher to cow milk ( $OR_A$  3.81, 95%CI, 1.20–12.14) and egg ( $OR_A$  5.24, 95%CI, 1.94–14.20).

**Conclusion:** A significant proportion of small children treated at the paediatric primary health care centres due to wheezing and/or atopic dermatitis had allergic sensitization. There appears to be a geoclimatic variation in the prevalence of sensitization to inhalant and food allergens among young children with allergic like symptoms who live in Spain.

© 2009 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

## Introducción

En muchas áreas geográficas del mundo, incluyendo España, la investigación epidemiológica ha constatado una elevada prevalencia de síntomas relacionados con el asma y las

enfermedades alérgicas en los niños al inicio de su período escolar<sup>1,2</sup>. También anteriormente, durante las etapas de lactante y preescolar, las manifestaciones clínicas respiratorias y cutáneas de posible naturaleza alérgica son muy frecuentes y, desde el punto de vista de la asistencia

sanitaria, motivo de un buen número de consultas en atención primaria<sup>3,4</sup>. En los niños pequeños, los síntomas asmáticos y las alteraciones cutáneas englobadas bajo el término dermatitis, aun cuando generalmente de carácter leve o moderado, constituyen un desafío para los clínicos del primer nivel asistencial, debido a la coexistencia de fenotipos de significado y pronóstico diferentes. Así, por ejemplo, las sibilancias de aparición precoz pueden ser transitorias en el corto plazo, tender a la desaparición al finalizar la edad escolar o acabar por configurarse como asma que persiste más allá de la adolescencia<sup>5-7</sup>. También la dermatitis atópica parece reconocer variantes, y aunque con frecuencia acaba por remitir, puede seguir un curso variable y recidivar en la edad adulta<sup>8,9</sup>. Los 2 procesos, además, participan de la secuencia clínica conocida como marcha alérgica, y recientemente se ha considerado que su coexistencia puede constituir un fenotipo de mal pronóstico en lo que respecta a la función pulmonar<sup>10,11</sup>. De cualquier forma, y sea cual fuere la relación íntima entre el asma y la dermatitis atópica, resulta evidente el papel que en la génesis y persistencia de ambos procesos desempeña la sensibilización alérgica, definida por la síntesis de inmunoglobulina E alérgicoespecífica (IgE<sub>AE</sub>) frente a sustancias comunes adquiridas por vía inhalatoria (neumoalérgenos) o digestiva (trofoalérgenos)<sup>7,10-13</sup>.

Si bien la historia natural de las enfermedades alérgicas se ha investigado ampliamente mediante estudios de cohortes poblacionales seguidos desde el nacimiento, existe menos información acerca de las características de la sensibilización dependiente de IgE en niños pequeños que presentan manifestaciones clínicas supuestamente relacionadas con la alergia<sup>10,14</sup>. En relación con esta cuestión, el estudio Aplicaciones de Phadiatop infant<sup>®</sup> en la Alergia Infantil (APIA), desarrollado en España con el objetivo primario de evaluar la exactitud de este test diagnóstico y su utilidad para la identificación precoz de la atopia, se ha ocupado del perfil de sensibilización alérgica en lactantes y preescolares que recibieron asistencia en el primer nivel asistencial por episodios de sibilancias o dermatitis atópica. Con un diseño multicéntrico basado en atención primaria, el estudio APIA programó la determinación sistemática de IgE<sub>AE</sub> circulantes frente a neumoalérgenos y trofoalérgenos comunes, circunstancia que ofreció la oportunidad de caracterizar la sensibilización IgE<sub>AE</sub> en la población infantil de distintas áreas geográficas españolas. Así, pues, el presente artículo plantea la descripción de la prevalencia y el tipo de sensibilización alérgica en niños de entre 0 y 5 años de edad con sibilancias o dermatitis atópica, y el análisis de la influencia que sobre el riesgo para presentar tal afección tienen distintos factores de carácter demográfico y ambiental; se hace especial énfasis en las variaciones observadas al respecto entre las regiones atlántica, continental y mediterránea que conforman la diversidad geoclimática de la península ibérica.

## Población y métodos

### Diseño

Estudio observacional, multicéntrico, de base en atención primaria, llevado a cabo en 20 centros de salud de 8 regiones

de España (Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) durante 24 meses (junio de 2002 a mayo de 2004). Previo al inicio del trabajo de campo, el Comité Ético de Investigación Clínica competente en la comunidad autónoma acreditó el estudio para cada centro participante.

### Sujetos

En orden consecutivo de asistencia a la consulta, el pediatra investigador invitó a tomar parte en el estudio a los niños de edad de entre 0 y 5 años en cuya historia clínica se encontrasen recogidos los diagnósticos médicos de sibilancias, sin considerar el número de episodios, o dermatitis atópica de cualquier gravedad. El protocolo, común para todos los centros, incluyó la realización de una historia alergológica y un cuestionario ambiental, según un modelo estructurado, el examen de la piel dirigido a la búsqueda de lesiones de dermatitis, y la obtención de una muestra de sangre para la determinación de IgE total, Phadiatop infant<sup>®</sup> (test cualitativo que detecta IgE<sub>AE</sub> frente a una mezcla balanceada de antígenos de inhalantes y alimentos comunes) y un amplio panel de IgE<sub>AE</sub> frente a neumoalérgenos y trofoalérgenos prevalentes. En total, se propuso la investigación a 486 niños, y 8 de éstos (1,6%) no se incluyeron porque la familia declinó la participación; adicionalmente, se excluyó del análisis a 10 niños más (2,1%) debido a la ausencia de resultados de los test diagnósticos de alergia por dificultades en la extracción o el procesamiento de la muestra de sangre.

### Evaluación clínica

Se consideró episodio de sibilancias a un proceso respiratorio agudo que motivó una visita médica, bien al centro de salud o bien al hospital, en cuyo registro clínico constaba de forma explícita la detección de sibilancias en la auscultación pulmonar, ya asociadas o no a otros síntomas y signos clínicos de obstrucción de las vías aéreas intrapulmonares, y que podían acompañarse de fiebre<sup>15</sup>. Respecto a la dermatitis atópica, se juzgó criterio suficiente la codificación de este proceso en la historia clínica, si bien en caso de encontrarse en fase activa en la visita de estudio, el diagnóstico se corroboró conforme a los criterios comúnmente establecidos, y su gravedad actual precisada con el índice SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis)<sup>16,17</sup>. En relación con la circunstancia de haber presentado uno o ambos procesos, los niños se clasificaron en los fenotipos “sibilancias sólo”, si habían presentado episodios de sibilancias pero no tenían historia de dermatitis atópica; “dermatitis sólo”, si se habían diagnosticado de dermatitis atópica pero nunca habían presentado episodios de sibilancias, y finalmente, “sibilancias y dermatitis”, si habían tenido con anterioridad ambos procesos, bien de manera concomitante o secuencial. Adicionalmente, se recogieron de la historia clínica los registros diagnósticos previos de laringitis aguda, rinitis alérgica e intolerancia/alergia a alimentos (anexo II, cuestionario alergológico).

## Cuestionario ambiental

En la visita de estudio la familia respondió a un cuestionario acerca de las características del hábitat residencial, número de hermanos y orden en la fratría, tipo de lactancia y, en su caso, duración de la lactancia natural, edad a la que el niño inició la asistencia a guardería, tabaquismo de la madre en la gestación y de los convivientes en la actualidad y presencia de mascotas en el hogar (anexo II, cuestionario ambiental). Se consideró lactancia materna la alimentación exclusiva con leche humana de al menos un mes de duración.

## Áreas geoclimáticas

Atendiendo a las condiciones atmosféricas propias de la zona geográfica en que se desarrolló la investigación, y a su influencia sobre la distribución y fenología de los neuroalérgenos testados (en especial ácaros y pólenes), se delimitaron las áreas geoclimáticas atlántica, en la que se incluyeron los niños habitantes en Asturias, Guipúzcoa y Pontevedra, continental, en la que se incluyeron los niños habitantes en Badajoz, Madrid, Huesca y Zaragoza, y mediterránea, en la que se incluyeron los niños habitantes de Barcelona, Sevilla y Málaga.

## Inmunoglobulinas E alergenoespecíficas

Las determinaciones de los test in vitro para la detección de la sensibilización alergenoespecífica se realizaron con el método Immuno CAP<sup>TM</sup> (Phadia AB, Uppsala, Sweden). Una vez obtenidas, las muestras de sangre se transportaron en un medio refrigerado para su procesamiento inmediato en el servicio de análisis clínicos de referencia en el área sanitaria de cada centro de salud participante en el estudio. En cada niño se testó un panel predeterminado de IgE<sub>AE</sub> que incluyó ácaros (*Dermatophagoides pteronyssinus* y *Dermatophagoides farinae*), epitelios de gato y perro, polen de gramíneas (*Dactylis glomerata*, *Festuca elatior*, *Lolium perenne*, *Phleum pratense*, *Poa pratensis* y *Secale cereale*), polen de árboles (*Acer negundo*, *Betula verrucosa*, *Corylus avellana*, *Quercus alba* y *Platanus acerifolia*, con la adición de *Cupressus arizonica* en el área geoclimática continental y *Olea europea* en las áreas geoclimáticas continental y mediterránea), polen de malezas (*Ambrosia elatior*, *Artemisia vulgaris*, *Plantago lanceolata*, *Chenopodium album*, *Salsola kali* y *Parietaria judaica*), hongos (*Penicillium chrysogenum*, *Cladosporium herbarum*, *Aspergillus fumigatus* y *Alternaria alternata*), leche de vaca, huevo, cacahuate, pescado (bacalao, atún y salmón) y gamba, ampliado según indicación de la historia alérgica personal (mínimo 10 y máximo 25 pruebas). En conjunto, los porcentajes de niños estudiados por clase de alérgenos fueron para ácaros del 100,0%, para gato del 99,8%, para perro del 99,8%, para gramíneas del 99,6%, para árboles del 83,8%, para malezas del 95,5%, para hongos del 99,4%, para huevo del 99,8%, para leche de vaca del 98,9%, para pescados/gamba del 98,8% y para cacahuate del 99,6%. Se consideró sensibilización alérgica cualquier resultado de IgE<sub>AE</sub> igual o superior a 0,35 kU/l.

## Análisis estadístico

La prevalencia de sensibilización alérgica se expresó como proporción con un intervalo de confianza (IC) del 95%. La relación entre la sensibilización alérgica y las características demográficas, ambientales y clínicas se analizó mediante la prueba de  $\chi^2$ , y en el caso de las 2 primeras, el cálculo de *odds ratio* ajustadas (OR<sub>A</sub>) con un IC del 95% a partir del ajuste de un modelo de regresión logística en el que, además de todas las variables estudiadas, se incluyeron la estación en que se realizó el estudio y el fenotipo clínico. Por último, la variación geoclimática en la prevalencia de sensibilización a las clases de alérgenos se analizó mediante el cálculo de OR<sub>A</sub> con un IC del 95% para las áreas continental y mediterránea respecto a la atlántica, mediante la utilización del modelo de regresión logística anteriormente descrito. Todos los datos, excepto los de carácter personal, se procesaron con la aplicación Microsoft Office 2003<sup>®</sup> (Microsoft Corporation) para generar una base en la que se definieron valores posibles y reglas de coherencia entre variables. Todos los cálculos estadísticos se realizaron con el programa SPSS<sup>®</sup> versión 11.0.1 (SPSS Inc.).

## Resultados

Se estudiaron 468 niños, con predominio de varones, de entre 0 y 5 años de edad, de los que tres cuartas partes habían tenido 3 o más episodios de sibilancias y a la mitad se los había diagnosticado de dermatitis atópica. Con respecto a la sensibilización alérgica, más de un tercio de los niños tuvo al menos una prueba de IgE<sub>AE</sub>  $\geq 0,35$  kU/l, de forma que una cuarta parte del conjunto presentó sensibilización a inhalantes y, asimismo, una cuarta parte presentó sensibilización a alimentos (tabla 1). Por fenotipos clínicos, la prevalencia de sensibilización dependiente de IgE casi alcanzó un tercio de los niños con “sibilancias sólo”, superó la mitad de los niños con “dermatitis sólo” y ocupó un lugar intermedio entre ambas proporciones en los niños con “sibilancias y dermatitis”. En relación con la edad, la prevalencia de sensibilización alérgica fue más alta en los niños de 3 a 5 años que en los de 0 a 2 años, circunstancia debida en buena medida al incremento de la sensibilización a neuroalérgenos ocurrida entre los primeros en los 3 fenotipos considerados (tabla 2).

En el conjunto de niños estudiado, el análisis bivalente encontró una asociación de la sensibilización alérgica global con el sexo, la edad, el área geoclimática, el tipo de lactancia, la dermatitis atópica actual y moderada-grave y el diagnóstico de alergia/intolerancia a alimentos; una asociación de la sensibilización a neuroalérgenos con el sexo, la edad, el área geoclimática, el tipo de lactancia, ir a guardería antes de cumplir 2 años, tener sibilancias sin infección respiratoria aguda concomitante, la dermatitis atópica moderada-grave y los diagnósticos de laringitis aguda, rinitis alérgica y alergia/intolerancia a alimentos, y una asociación de la sensibilización a trofoalérgenos con el sexo, el área geoclimática, tener más de 3 episodios de sibilancias, la dermatitis atópica actual y moderada-grave y el diagnóstico de alergia/intolerancia a alimentos (tabla 3). Sin embargo, muchas de las asociaciones referidas perdieron

su significación en el análisis multivariante, de forma que sólo se mantuvo un incremento del riesgo en el sexo masculino para la sensibilización tanto global como a neumoaérgenos y trofoaérgenos, la edad para la

sensibilización global y a neumoaérgenos, el área geoclimática continental respecto a la atlántica para la sensibilización global y a trofoaérgenos, y el área mediterránea respecto a la atlántica para la sensibilización a trofoaérgenos, así como una disminución del riesgo con la lactancia materna para la sensibilización global y a neumoaérgenos (tabla 4).

Finalmente, el análisis del patrón geoclimático de la sensibilización a las distintas clases de aérgenos mostró para el área continental respecto a la atlántica un riesgo menor de sensibilización a ácaros y un riesgo mayor a pólenes de gramíneas, leche de vaca, huevo, pescado/marisco y cacahuete, mientras que para el área mediterránea respecto a la atlántica mostró un riesgo menor de sensibilización a ácaros y un riesgo mayor a leche de vaca y huevo (tabla 5).

**Tabla 1** Características demográficas, clínicas y de sensibilización alérgica en los niños participantes en el estudio Aplicaciones de Phadiatop infant<sup>®</sup> en la Alergia Infantil (n=468)

	n	%
<i>Características demográficas</i>		
Sexo		
Masculino	287	61,3
Femenino	181	38,7
Edad		
0-2 años	208	44,4
3-5 años	260	55,6
<i>Características clínicas</i>		
Episodios de sibilancias		
Recurrentes ( $\geq 3$ episodios)	406	86,8
Sin catarro de vías altas	351	76,3
Dermatitis atópica		
Dermatitis actual	243	51,9
Leve*	178	38,0
Moderada/grave*	87	18,6
Otras manifestaciones alérgicas		
Alergia/intolerancia a alimentos	39	8,4
Rinitis estacional o perenne	67	15,5
<i>Sensibilización alérgica (IgE<sub>AE</sub> <math>\geq 0,35</math> kU/l)</i>		
Global (neumoaérgenos o trofoaérgenos)	178	38,0
Neumoaérgenos	121	25,9
Trofoaérgenos	116	24,8

IgE: inmunoglobulina E.

\*Índice SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis) (clasificación de la gravedad no disponible en 4 niños).

## Discusión

El estudio APiA investigó la frecuencia y el tipo de sensibilización alérgica, así como los factores relacionados con ambas características, en niños de 0 a 5 años de edad que consultaron en el primer nivel asistencial por episodios de sibilancias o dermatitis atópica. En una muestra poblacional con representación de distintas áreas geoclimáticas españolas, el estudio APiA detectó sensibilización a neumoaérgenos o trofoaérgenos en una proporción relevante (38%) de los niños pequeños tratados en atención primaria por tales procesos, cualesquiera que fuesen su recurrencia o gravedad. En lo que se refiere al tipo de sensibilización, se observó un porcentaje similar para inhalantes (26%) y alimentos (25%), circunstancia que refleja la importancia de la vía digestiva en el inicio del fenómeno alérgico y, por otro lado, indica la pertinencia de considerar ambas categorías de aérgenos en la evaluación de las manifestaciones clínicas de posible causa alérgica acontecidas en la infancia temprana. Por otro lado, habida cuenta de que la muestra se generó en condiciones asistenciales reales, el estudio APiA ilustra la rentabilidad potencial de la determinación de anticuerpos IgE<sub>AE</sub> en el examen

**Tabla 2** Sensibilización inmunoglobulina E alergenoespecífica global y para neumoaérgenos y trofoaérgenos, por edad y fenotipo clínico en los niños participantes en el estudio Aplicaciones de Phadiatop infant<sup>®</sup> en la Alergia Infantil

IgE alergenoespecífica $\geq 0,35$ kU/l	Sibilantes sólo		Dermatitis sólo		Sibilantes y dermatitis	
	%	IC del 95%	%	IC del 95%	%	IC del 95%
Global (neumoaérgenos o trofoaérgenos)	32,4	(26,3-38,6)	54,8	(42,1-67,6)	39,2	(32,0-46,4)
Lactantes (0-2 años)	25,7	(17,1-34,4)	51,1	(33,5-69,5)	30,1	(19,4-40,9)
Niños preescolares (3-5 años)	37,9	(29,2-46,6)	58,6	(39,6-77,7)	45,8	(36,2-50,6)
Neumoaérgenos	23,1	(17,6-28,7)	24,2	(13,2-35,2)	29,8	(23,1-36,6)
Lactantes (0-2 años)	15,8	(8,6-23,1)	3,0	(0,0-9,2)	13,7	(5,6-21,8)
Niños preescolares (3-5 años)	29,0	(20,9-37,1)	48,3	(28,9-67,6)	41,1	(31,6-50,6)
Trofoaérgenos	19,1	(13,9-24,3)	46,8	(34,0-59,5)	24,4	(18,1-30,8)
Lactantes (0-2 años)	16,8	(9,4-24,3)	51,5	(33,5-69,5)	24,7	(14,5-34,8)
Niños preescolares (3-5 años)	21,0	(13,7-28,2)	41,4	(22,3-60,4)	24,3	(16,0-32,6)

IC: intervalo de confianza; IgE: inmunoglobulina E.



**Tabla 3** Sensibilización a inmunoglobulina E alergenoespecífica global y a neumoalérgenos y trofoalérgenos, según las características demográficas, epidemiológicas y clínicas de los niños participantes en el estudio Aplicaciones de Phadiatop infant<sup>®</sup> en la Alergia Infantil

			Global			Neumoalérgenos			Trofoalérgenos		
	n	%	n	%	p	n	%	p	n	%	p
<i>Características demográficas</i>											
Sexo (masculino)	287	61,3	124	69,7	0,004	87	71,9	0,006	81	69,8	0,029
Edad (3–5 años)	260	55,6	113	63,5	0,007	94	77,7	0,000	64	55,2	0,900
Área residencial (urbana)	397	85,0	153	86,0	0,654	107	88,4	0,221	100	86,2	0,669
Área geoclimática					0,011			0,020			0,000
Atlántica	118	25,2	36	30,5		31	26,3		12	10,2	
Continental	209	44,7	95	45,5		65	31,1		70	33,5	
Mediterránea	141	30,1	47	33,3		25	17,7		34	24,3	
Estación de estudio (primavera)	261	55,8	101	56,7	0,740	69	57,0	0,747	66	56,9	0,801
<i>Características ambientales</i>											
Hermanos (n ≥ 1)	288	62,1	113	63,8	0,537	75	62,5	0,910	73	62,9	0,809
Lactancia materna (≥ 1 mes)	349	76,5	125	71,0	0,028	83	69,2	0,026	84	73,0	0,314
Guardería (inicio edad < 2 años)	154	33,0	51	28,7	0,113	28	23,1	0,007	38	32,8	0,969
Tabaco durante la gestación	127	27,7	44	25,0	0,313	29	24,2	0,318	30	26,1	0,649
Fumadores en el hogar	209	44,8	78	43,8	0,725	52	43,0	0,630	55	47,4	0,537
Mascota en el hogar	138	29,6	44	24,9	0,078	31	25,8	0,292	27	23,5	0,105
<i>Características clínicas</i>											
Antecedente familiar asma	189	41,5	79	45,4	0,188	52	44,1	0,517	52	46,0	0,251
Antecedente familiar dermatitis	181	39,9	75	43,1	0,267	47	39,8	0,992	52	46,0	0,115
<i>Sibilancias</i>											
Sibilancias recurrentes (≥ 3)	351	76,3	126	72,4	0,126	91	77,8	0,664	78	68,4	0,023
Sibilancias sin catarro de vías altas	180	38,8	78	43,8	0,080	65	53,7	0,000	43	37,1	0,684
<i>Dermatitis atópica</i>											
Dermatitis actual	178	38,0	79	44,4	0,027	48	39,7	0,667	61	52,6	0,000
Dermatitis (moderada-grave)	80	50,0	48	61,5	0,006	48	62,5	0,042	60	63,3	0,009
Laringitis aguda	135	29,2	59	33,3	0,120	47	39,2	0,005	32	27,8	0,748
Rinitis alérgica	67	14,5	32	18,3	0,074	27	22,9	0,003	13	11,5	0,228
Alergia/intolerancia alimentos	39	8,4	23	13,0	0,005	16	13,3	0,024	20	17,4	0,000

alergológico de lactantes y preescolares con síntomas respiratorios o cutáneos tratados en el primer nivel. Así, el presente estudio complementa trabajos previos que proponen el uso de pruebas objetivas para mejorar la precisión del diagnóstico de la alergia en atención primaria, en este caso en niños de corta edad con síntomas comunes cuya intensidad leve o moderada no precisan su derivación al nivel especializado, pero pueden beneficiarse de alguna intervención terapéutica específicamente dirigida a esta afección<sup>18</sup>.

Con respecto a las manifestaciones clínicas, el estudio APiA describió 3 fenotipos fácilmente diferenciables: “sibilancias sólo” (sin historia de eccema), “dermatitis sólo” (sin historia de sibilancias) y, de manera distintiva, “sibilancias y dermatitis” (presentes simultánea o secuencialmente), ya que la coexistencia de ambos procesos revela un trasfondo atópico e implica una probabilidad mayor de sensibilización alérgica<sup>11,19</sup>. Adicionalmente, la clasificación de las sibilancias según su asociación a manifestaciones cutáneas puede tener un interés clínico, pues la dermatitis atópica diagnosticada por el médico es un criterio de positividad

de un índice de predicción de asma muy utilizado en el tratamiento de las sibilancias recurrentes en menores de 3 años<sup>20,21</sup>. No obstante, en el estudio APiA la proporción de sensibilización alérgica del fenotipo “sibilancias y dermatitis” ocupó una posición intermedia (39%) entre las correspondientes a los fenotipos “dermatitis sólo” (55%) y “sibilancias sólo” (32%). Así, pues, en los niños con sibilancias incluidos en el presente estudio, el antecedente diagnóstico de dermatitis atópica, sin otra precisión acerca de su presencia actual o gravedad, implicó tan sólo un discreto incremento de la probabilidad de sensibilización dependiente de IgE, situación que apoya la idoneidad de la evaluación del estatus alérgico en ambos fenotipos respiratorios. Acerca de esta cuestión, es preciso tener en cuenta que algunos trabajos han demostrado que la detección de sensibilización temprana, en especial a neumoalérgenos, puede sustituir con ventaja a otros criterios en la predicción del riesgo de tener asma en edades posteriores de la vida<sup>14</sup>.

Tal y como era de prever, la frecuencia y el tipo de sensibilización predominante, ya a inhalantes o alimentos, observados en el estudio APiA guardaron una relación

**Tabla 4** Estimación de *odds ratio* ajustadas para la sensibilización inmunoglobulina E alergenoespecífica global y a neumoaérgenos y trofoaérgenos, según las características demográficas y epidemiológicas en los niños participantes en el estudio Aplicaciones de Phadiatop infant<sup>®</sup> en la Alergia Infantil

	Global		Neumoaérgenos		Trofoaérgenos	
	OR <sub>A</sub>	IC del 95%	OR <sub>A</sub>	IC del 95%	OR <sub>A</sub>	IC del 95%
<i>Características demográficas</i>						
Sexo (masculino)	1,91	(1,24–2,95)	1,92	(1,16–3,19)	1,77	(1,08–2,91)
Edad (3–5 años)	1,96	(1,27–3,00)	4,42	(2,61–7,49)	1,15	(0,71–1,86)
Estación (primavera)	1,09	(0,71–1,66)	1,13	(0,70–1,83)	1,01	(0,62–1,63)
Área de residencia (urbana)	1,20	(0,66–2,18)	1,73	(0,86–3,49)	1,05	(0,52–2,10)
<i>Área geoclimática</i>						
Atlántica	1,00		1,00		1,00	
Continental	2,26	(1,30–3,93)	1,38	(0,76–2,52)	6,15	(2,88–13,10)
Mediterránea	1,39	(0,76–2,55)	0,67	(0,33–1,34)	4,06	(1,81–9,12)
<i>Características ambientales</i>						
Hermanos (n ≥ 1)	1,08	(0,69–1,68)	1,02	(0,61–1,68)	1,23	(0,75–2,02)
Lactancia materna (≥ un mes)	0,51	(0,31–0,84)	0,50	(0,28–0,86)	0,58	(0,33–1,03)
Guardería (inicio edad < 2 años)	0,88	(0,56–1,38)	0,71	(0,42–1,23)	1,12	(0,68–1,85)
Tabaco durante la gestación	0,85	(0,51–1,42)	0,80	(0,44–1,44)	0,92	(0,51–1,65)
Fumadores en el hogar (actual)	1,01	(0,64–1,61)	0,84	(0,50–1,41)	1,39	(0,82–2,35)
Mascota en el hogar (actual)	0,66	(0,42–1,06)	0,82	(0,48–1,39)	0,59	(0,34–1,02)

IC: intervalo de confianza; OR<sub>A</sub>: *odds ratio* ajustada.

**Tabla 5** Estimación de *odds ratio* ajustadas para la sensibilización de inmunoglobulina E alergenoespecífica a clases de inhalantes y alimentos, según el área geoclimática de los niños participantes en el estudio Aplicaciones de Phadiatop infant<sup>®</sup> en la Alergia Infantil

	Atlántica		Continental			Mediterránea		
	%	OR <sub>A</sub>	%	OR <sub>A</sub>	IC del 95%	%	OR <sub>A</sub>	IC del 95%
<i>Neumoaérgenos</i>								
Ácaros	25,4	1,00	7,2	0,16	(0,07–0,36)	9,9	0,29	(0,13–0,64)
Epitelios	5,9	1,00	8,6	1,41	(0,49–4,00)	2,9	0,49	(0,13–1,90)
Gato	3,4	1,00	5,7	1,93	(0,52–7,12)	0,0	-	
Perro	5,1	1,00	6,2	1,06	(0,32–3,54)	2,9	0,58	(0,13–2,49)
Pólenes	10,3	1,00	24,4	5,13	(2,27–11,57)	5,7	0,86	(0,31–2,41)
Gramíneas	9,5	1,00	21,1	4,65	(1,99–10,86)	2,8	0,45	(0,13–1,61)
Árboles	2,4	1,00	16,7	7,39	(0,84–65,16)	5,0	1,62	(0,17–15,61)
Malezas	5,2	1,00	8,6	2,91	(0,94–9,00)	0,8	0,25	(0,03–2,33)
Hongos	1,7	1,00	5,7	5,02	(0,90–28,09)	3,6	2,95	(0,43–20,21)
<i>Trofoaérgenos</i>								
Leche de vaca	4,3	1,00	17,2	5,17	(1,71–15,62)	12,9	3,81	(1,20–12,14)
Huevo	5,1	1,00	21,1	5,26	(2,04–13,62)	19,3	5,24	(1,94–14,20)
Pescado/marisco	1,7	1,00	5,8	9,38	(1,54–57,18)	2,2	3,03	(0,41–22,46)
Cacahuete	3,4	1,00	12,0	7,75	(2,15–27,94)	3,6	2,07	(0,47–9,19)

IC: intervalo de confianza; OR<sub>A</sub>: *odds ratio* ajustada.

estrecha con la edad. En primer lugar, la sensibilización tanto global como a neumoaérgenos o trofoaérgenos ocurrió en mayor proporción en los niños de 3 a 5 años que en los de 0 a 2 años, con la sola excepción de la correspondiente a alimentos, en los que presentaron

dermatitis atópica sin historia de sensibilizaciones. Por otro lado, en los niños de menor edad la proporción de sensibilización a inhalantes fue siempre menor que la sensibilización a alimentos, sobre todo en el fenotipo antes aludido, mientras que en los mayores se produjo exactamente la situación

inversa. Además, el análisis multivariante abundó en la misma conclusión, pues el riesgo de sensibilización a neumoaérgenos se incrementó de manera significativa con la edad ( $OR_A$ : 4,4; IC del 95%: 2,6–7,5) mientras que el riesgo de sensibilización a trofoaérgenos no varió según ésta ( $OR_A$ : 1,2; IC del 95%: 0,7–1,9). Puestos en conjunto, los resultados observados en el estudio APiA se ajustan fielmente a la secuencia denominada marcha alérgica; según ésta, las primeras respuestas  $IgE_{AE}$  ocurren frente a proteínas contenidas en alimentos, como leche y huevo, para más tarde desarrollarse frente a inhalantes tanto domésticos como del exterior, a la vez que, en paralelo, se desarrollan las manifestaciones clínicas, inicialmente digestivas y cutáneas (alergia a alimentos y dermatitis atópica) y posteriormente respiratorias (asma y rinitis alérgica)<sup>10</sup>.

Aunque la variabilidad en la metodología impone límites a la interpretación de los hallazgos, resulta interesante comparar las prevalencias de sensibilización alérgica observadas en el estudio APiA con las de cohortes de base poblacional originarias de otras áreas geográficas. Así, por ejemplo, una investigación realizada en Inglaterra encontró porcentajes de sensibilización a los 4 años muy parecidos a los del presente estudio en niños con diagnóstico médico de asma (44%) y de eccema (43%)<sup>22</sup>. También otro trabajo llevado a cabo en Dinamarca observó proporciones de sensibilización a los 18 meses y 5 años superponibles a las del estudio APiA en niños con asma actual (el 25 y el 39%, respectivamente), si bien difirieron bastante en los niños que tuvieron dermatitis actual (el 9 y el 78% en ese orden de edad)<sup>23</sup>. Además, un análisis longitudinal desarrollado en Australia detectó un porcentaje de sensibilización similar al del presente estudio en preescolares con asma reciente (37%), mientras que otro estudio transversal realizado en Italia observó una proporción sólo algo menor en niños de esa edad con dermatitis atópica definida mediante cuestionario (32%)<sup>24,25</sup>. Por otro lado, las prevalencias de sensibilización alérgica reportadas en la literatura médica suelen ser claramente superiores cuando se seleccionan sujetos con antecedentes familiares de atopia o procesos alérgicos de mayor intensidad. Así, por ejemplo, un trabajo llevado a cabo en Estados Unidos de América detectó una proporción de sensibilización a los 2–3 años bastante superior a la del estudio APiA en niños con más de 3 episodios de sibilancias que cumplieron criterios adicionales de riesgo de asma (en total 61%, a inhalantes el 54%, y a alimentos el 33%)<sup>14</sup>. En el mismo sentido, una investigación de base hospitalaria desarrollada en Suecia observó una prevalencia acumulada de sensibilización entre 0–7 años también muy superior en niños con dermatitis atópica moderada/grave (inhalantes, el 80% y alimentos, el 62%)<sup>26</sup>. Así, pues, si bien las diferencias pueden atribuirse parcialmente a cuestiones metodológicas, como el uso de diferentes técnicas (in vivo o in vitro) para la evaluación de la alergia y, sin duda, los factores ambientales desempeñan un papel importante, se puede concluir que las prevalencias de sensibilización alérgica observadas en el estudio APiA se encuentran más próximas a las de cohortes no seleccionadas y podrían considerarse representativas del conjunto de la población infantil con síntomas de posible origen alérgico.

El estudio APiA constató un fuerte incremento del riesgo de sensibilización alérgica en el sexo masculino ( $OR_A$ : 1,9),

con predominio durante la infancia que, asimismo, otros trabajos han mostrado ya presente a una edad muy temprana<sup>27</sup>. En cuanto a las características ambientales, resulta interesante destacar el menor riesgo de sensibilización observado en los niños que fueron amamantados ( $OR_A$ : 0,5; IC del 95%: 0,3–0,8), en especial en la situación actual, en que el paradigma que atribuye a la lactancia materna un papel protector frente a las enfermedades alérgicas se está poniendo en entredicho<sup>28</sup>. A este respecto, estudios de cohortes y de intervención dirigidos específicamente a explorar esta cuestión han verificado la asociación entre la lactancia materna exclusiva mantenida y el estatus alérgico, sobre todo en hijos de madres con trasfondo atópico<sup>29,30</sup>. Así, pues, el hallazgo realizado en el presente estudio precisa una explicación alternativa, que puede venir dada por el efecto protector que ejerce la lactancia materna sobre las infecciones respiratorias agudas de origen viral causantes de las sibilancias precoces no atópicas<sup>21</sup>. Por otro lado, el estudio APiA no detectó ningún influjo de las infecciones en la infancia temprana, evaluado a través de marcadores epidemiológicos como el número de hermanos y la asistencia a guardería, sobre la probabilidad de sensibilización, hecho que, cuando menos, no opera en contra de un hipotético papel protector de la lactancia natural frente a las enfermedades alérgicas. En cuanto al tabaco, el presente estudio no advirtió ningún efecto de este hábito en la madre durante la gestación ni de la convivencia con fumadores en el hogar sobre el riesgo de sensibilización dependiente de  $IgE$ , hallazgo que se encuentra en consonancia con buena parte de los estudios epidemiológicos que han abordado esta compleja cuestión sobre la que hay informes contradictorios, si bien un exhaustivo metaanálisis ha establecido que resulta poco probable que la exposición prenatal o durante los primeros años de vida al tabaco incremente el riesgo de sensibilización alérgica en niños de manera significativa<sup>31,32</sup>. Por último, el estudio APiA no pudo demostrar de forma fehaciente un efecto de la exposición a alérgenos de origen animal sobre la probabilidad de sensibilización alérgica, aunque en este caso no se puede descartar un error estadístico tipo  $\beta$ , ya que se apreció una tendencia a la protección del riesgo de sensibilización a alimentos en caso de presencia de mascotas en el hogar ( $OR_A$ : 0,6; IC del 95%: 0,3–1,0), circunstancia que también se ha puesto de manifiesto en otros estudios<sup>33</sup>.

Tal vez las observaciones más interesantes del estudio APiA derivan de su carácter multicéntrico y se refieren, precisamente, a la distribución geoclimática de la sensibilización alérgica en la primera infancia en un territorio cuya población teóricamente comparte muchos factores ambientales, incluyendo los relacionados con el estilo de vida, implicados en la génesis de las enfermedades alérgicas. Como preámbulo a esta cuestión, sirva señalar que el International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) ha mostrado la influencia de variables atmosféricas, como la humedad relativa y la temperatura medias, en la prevalencia de los síntomas de asma y dermatitis atópica durante la infancia<sup>34</sup>. Por otro lado, la península ibérica constituye un ámbito geográfico apropiado para el estudio de las variaciones climáticas, ya que en un espacio relativamente pequeño coexisten 3 subtipos de clima templado, atlántico (oceánico) y mediterráneo en los litorales respectivos, y continental (mediterráneo continen-



talizado) en la meseta interior. Así, el ISAAC España ha observado una prevalencia de síntomas de asma y dermatitis a los 6–7 años en el área atlántica norte (costa gallega y cornisa cantábrica) más elevada que en la continental y, en menor proporción, la mediterránea, circunstancia que se ha atribuido principalmente al efecto del clima sobre la distribución geográfica de diversos neuroalérgenos (ácaros y pólenes)<sup>35,36</sup>. No obstante, la realidad parece ser algo más compleja, ya que el mismo ISAAC ha detectado una proporción de sensibilización alérgica a los 10–11 años claramente superior en una ciudad de clima continental (Madrid) que en otra ciudad de clima mediterráneo (Cartagena), si bien la fracción poblacional de asma atribuible a la atopía fue mayor en esta última localidad<sup>37</sup>.

El estudio APiA observó una proporción de sensibilización alérgica en el área geoclimática continental (46%) superior a la existente en las áreas mediterránea (33%) y atlántica (31%), de forma que, respecto a esta última, el riesgo estimado se incrementó ampliamente en la primera (OR<sub>A</sub>: 2,3; IC del 95%: 1,3–3,9). Así, pues, al dar por sentadas la uniformidad en la metodología del estudio y las características de la población analizada, se puede considerar la influencia del clima, si se atiende a la probabilidad de sensibilización de los distintos alérgenos implicados. En el presente estudio no hubo diferencias apreciables entre áreas geoclimáticas en la proporción de sensibilización a inhalantes, si bien lógicamente su clase vino dada por la distribución geográfica de los alérgenos considerados. Como era de esperar, los principales causantes de la sensibilización en el área atlántica fueron los ácaros (25,4%), en el área continental los pólenes (24,4%) y en el área mediterránea nuevamente los ácaros (9,9%), si bien en menor proporción que en la primera. Por contra, se advirtió un marcado incremento del riesgo de sensibilización a alimentos tanto en el área continental (OR<sub>A</sub>: 6,1; IC del 95%: 2,9–13,1) como en la mediterránea (OR<sub>A</sub>: 4,1; IC del 95%: 1,8–9,1) respecto a la atlántica, y los principales implicados en las 3 áreas consideradas fueron el huevo y la leche. Así, pues, el estudio APiA puso de manifiesto la posible influencia de factores geoclimáticos en la sensibilización alérgica a alimentos en niños pequeños con sibilancias o dermatitis atópica, hallazgo no reportado para el país, que precisa confirmarse o descartarse mediante un estudio de diseño multicéntrico específicamente dirigido a dirimir esta cuestión. Mientras tanto, resulta difícil atribuir un origen a semejante discrepancia, pues si bien el diseño transversal del presente estudio no permite excluir un sesgo de selección de la muestra, resulta improbable esta eventualidad dado el protocolo común de inclusión, el ajuste de posibles factores de confusión, y la congruencia de los resultados obtenidos para la sensibilización a inhalantes. Tampoco parece probable que las variaciones en la distribución geoclimática de la sensibilización a alimentos observada se deban a diferencias geográficas en los hábitos alimentarios de la población infantil, dadas la generalidad y homogeneidad del consejo nutricional, incluyendo el calendario de introducción de la alimentación complementaria, realizado desde la edad de lactante en la atención primaria pediátrica. A este respecto, un estudio ha demostrado diferencias entre Suecia y Estonia en la prevalencia de sensibilización a alimentos en

niños de 10–11 años con síntomas de asma en el año previo, que se atribuyeron al estilo de vida, mucho más occidentalizado en el país escandinavo, al que correspondió la sensibilización más elevada, así como a la distinta composición de la flora intestinal derivada de los hábitos dietéticos existentes en los 2 países<sup>38</sup>.

En síntesis, el estudio APiA constató que una proporción relevante de los niños de 0 a 5 años de edad que reciben asistencia sanitaria en atención primaria por episodios de sibilancias o dermatitis atópica presentan sensibilización a neuroalérgenos o trofoalérgenos comunes. Asimismo, el estudio APiA observó variaciones en la prevalencia de sensibilización alérgica, y en las clases de alérgenos causantes de ésta, entre las distintas áreas geoclimáticas de la península ibérica, diferencias sólo parcialmente explicadas por la distribución geográfica de los alérgenos implicados y que, en todo caso, deberán confirmarse mediante estudios específicamente diseñados para esa finalidad.

## Conflicto de intereses

Los autores han recibido aportaciones económicas de Phadia España para la puesta en marcha de actividades de docencia e investigación relacionadas con el asma y las enfermedades alérgicas. El estudio APiA ha recibido soporte económico, material y logístico de Phadia España.

## Financiación

El estudio APiA ha recibido soporte económico, material y logístico de Phadia España.

## Agradecimientos

A las enfermeras que se ocuparon de la obtención de la muestra de sangre y a los facultativos de análisis clínicos que realizaron las determinaciones de los test de alergia.

## Anexo I. Grupo de Estudio APiA

Díaz Vázquez C. (coordinador), Jiménez Cortés A., Lora Espinosa A., Praena Crespo M. (Andalucía), Pardos Martínez C., Castillo Laíta J. A. (Aragón), Carvajal Urueña I., Díaz Vázquez C., Domínguez Aurrecochea B., García Merino A. (Asturias), Delgado Ayza M., García Gallego A., De Muga Doria M. E., Pérez Porcuna X. M., Ridao Redondo M. L., Torregrosa Bertet M. J. (Cataluña), Aguilar Peral M., Morell Bernabé J. J. (Extremadura), Bamonde Rodríguez L., Garnelo Suárez L. (Galicia), Blanco González J. E., Cortés Rico O., Montón Álvarez J. L., Pascual Pérez J. M., Sánchez Gómez J. (Comunidad de Madrid), Callén Blecua M. (País Vasco).

## Anexo II. Cuestionarios alergológico y ambiental

CUESTIONARIO ALERGOLÓGICO (a cumplimentar por el pediatra durante la entrevista clínica)

- Criterios de Inclusión

1. Episodios de Sibilancias (según definición operativa): sí  no

- número total de episodios: \_\_\_\_\_

- tipología de los episodios (pueden marcarse varias opciones):

bronquiolitis		sibilancias con catarro		sibilancias sin catarro
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>
				no <input type="checkbox"/>

2. Dermatitis Atópica (registro diagnóstico en la historia): sí  no

- índice SCORAD (en caso de enfermedad activa):

leve  moderada  grave  indeterminada

- Patologías Relacionadas

dermatitis seborreica		dermatitis irritativa / urticaria	
		contacto	
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
		sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

rinitis persistente		otitis media aguda	otitis serosa
		recurrente	
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
		sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

conjuntivitis recurrente		laringitis aguda	neumonía aguda
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
		sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

alergia / intolerancia alimentaria

sí  no  - alimento implicado (si respuesta positiva): \_\_\_\_\_

- Antecedentes Familiares

1. Sensibilización Ig E dependiente demostrada:

madre		padre		hermana/o		otros familiares
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>
						no <input type="checkbox"/>

2. Asma (diagnóstico médico):

madre		padre		hermana/o		otros familiares
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>
						no <input type="checkbox"/>

3. Rinitis Alérgica (diagnóstico médico):

madre		padre		hermana/o		otros familiares
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>
						no <input type="checkbox"/>

4. Dermatitis Atópica / Eczema (diagnóstico médico):

madre		padre		hermana/o		otros familiares
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>
						no <input type="checkbox"/>

- Observaciones (a cumplimentar por el pediatra investigador):

CUESTIONARIO AMBIENTAL (a cumplimentar por el pediatra durante la entrevista clínica)

- Fratría (indicar la posición en la prole y el número total de hermanos): \_\_\_\_ ° de \_\_\_\_

- Hábitat residencial del domicilio familiar: urbano  rural  semirural

- Lactancia Materna

1. ¿alimentó de forma natural (lactancia materna) la madre al sí  no   
niño/a?

en caso de respuesta afirmativa precisar la duración de la lactancia natural (meses):  
\_\_\_\_\_

- Tabaco

1. ¿fumó cigarrillos la madre del niño/a durante su embarazo? sí  no

en caso de respuesta afirmativa precisar el número de cigarrillos en cada trimestre de gestación:

- primer trimestre: \_\_\_\_ - segundo trimestre: \_\_\_\_ - tercer trimestre: \_\_\_\_

2. ¿cuantos de los convivientes del niño/a fuman cigarrillos en la actualidad?

número de fumadores convivientes en el hogar: \_\_\_\_

en caso de respuesta afirmativa describir quien:

madre		padre		otros convivientes
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

- Mascotas (perro, gato, hámster, pájaro, etc.)

1. ¿tienen una mascota en el domicilio del niño/a en la sí  no   
actualidad?

edad del niño/a a la que estaba presente la mascota al hogar (meses): \_\_\_\_

tipo de animal (en caso de respuesta afirmativa):

perro		gato		roedor		otros
sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

- Guardería / Escolarización

1. ¿ha iniciado el niño/a la asistencia a guardería / escuela? sí  no

en caso de respuesta afirmativa precisar la edad de inicio: \_\_\_\_

## Bibliografía

- Asher MI, Montefort S, Björkstén B, Lai CK, Strachan DP, Weiland SK, et al. ISAAC Phase Three Study Group. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. *Lancet*. 2006;368:733–43.
- García-Marcos L, Blanco Quirós A, García Hernández G, Guillén Grima F, González Díaz C, Carvajal Urueña I, et al. Stabilization of asthma prevalence among adolescents and increase among schoolchildren (ISAAC phases I and III) in Spain. *Allergy*. 2004;59:1301–1307.
- Kuehni CE, Davis A, Brooke AM, Silverman M. Are all wheezing disorders in very young (preschool) children increasing in prevalence? *Lancet*. 2001;357:1821–5.
- Mohammedamin RS, Van der Wouden JC, Koning S, Van der Linden MW, Schellevis FG, Van Suijlekom-Smit LW, et al. Increasing incidence of skin disorders in children? A comparison between 1987 and 2001 *BMC Dermatol*. 2006;6:4–11.
- Martínez FD. Development of wheezing disorders and asthma in preschool children. *Pediatrics*. 2002;109:362–7.
- Morgan WJ, Stern DA, Sherrill DL, Guerra S, Holberg CJ, Guilbert TW, et al. Outcome of asthma and wheezing in the first 6 years of life: Follow-up through adolescence. *Am J Respir Crit Care Med*. 2005;172:1253–8.
- Sears MR, Greene JM, Willan AR, Wiecek EM, Taylor DR, Flannery EM, et al. A longitudinal, population-based, cohort study of childhood asthma followed to adulthood. *N Engl J Med*. 2003;349:1414–22.
- Kusel MM, Holt PG, De Klerk N, Sly PD. Support for 2 variants of eczema. *J Allergy Clin Immunol*. 2005;116:1067–72.

9. Williams HC, Strachan DP. The natural history of childhood eczema: Observations from the British 1958 birth cohort study. *Br J Dermatol*. 1998;139:834-9.
10. Wahn U. What drives the allergic march? *Allergy*. 2000;55:591-9.
11. Illi S, Von Mutius E, Lau S, Nickel R, Grüber C, Niggemann B, et al. Multicenter Allergy Study Group. The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. *J Allergy Clin Immunol*. 2004;113:925-31.
12. Hill DJ, Sporik R, Thorburn J, Hosking CS. The association of atopic dermatitis in infancy with immunoglobulin E food sensitization. *J Pediatr*. 2000;137:475-9.
13. Illi S, Von Mutius E, Lau S, Niggemann B, Gruber C, Wahn U, Multicentre Allergy Study (MAS) group. Perennial allergen sensitisation early in life and chronic asthma in children: A birth cohort study. *Lancet*. 2006;368:763-70.
14. Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, Bacharier LB, Boehmer SJ, Krawiec M, et al. Atopic characteristics of children with recurrent wheezing at high risk for the development of childhood asthma. *J Allergy Clin Immunol*. 2004;114:1282-7.
15. Cano Garcinuño A, Pérez García I, García Puertas J, Casas Rodríguez P. Tabaco, lactancia y sibilancias en los primeros tres años. *An Pediatr (Barc)*. 2003;59:541-7.
16. Hanifin J, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. *Acta Derm Venereol*. 1980;92:44-7.
17. European Task Force On Atopic Eczema (ETFAD). Severity scoring of atopic eczema: The SCORAD Index. *Dermatology*. 1993;186:23-31.
18. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, Petersson CJ. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. *Allergy*. 2004;59:35-41.
19. Kjaer HF, Eller E, Høst A, Andersen KE, Bindeslev-Jensen C. The prevalence of allergic diseases in an unselected group of 6-year-old children. The DARC birth cohort study. *Pediatr Allergy Immunol*. 2008;19:737-45.
20. Castro-Rodríguez JA, Holberg CJ, Wright AL, Martínez FD. A clinical index to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing. *Am J Respir Crit Care Med*. 2000;162:1403-6.
21. Pérez-Yarza EG, Sardón Prado O, Korta Murúa J. Sibilancias recurrentes en menores de tres años: evidencias y oportunidades. *An Pediatr (Barc)*. 2008;69:369-82.
22. Arshad SH, Tariq SM, Matthews S, Hakim E. Sensitization to common allergens and its association with allergic disorders at age 4 years: A whole population birth cohort study. *Pediatrics*. 2001;108:E33.
23. Høst A, Halken S, Jacobsen HP, Christensen AE, Herskind AM, Plesner K. Clinical course of cow's milk protein allergy/intolerance and atopic diseases in childhood. *Pediatr Allergy Immunol*. 2002;13:23-8.
24. Haby MM, Peat JK, Marks GB, Woolcock AJ, Leeder SR. Asthma in preschool children: Prevalence and risk factors. *Thorax*. 2001;56:589-95.
25. Peroni DG, Piacentini GL, Bodini A, Rigotti E, Pigozzi R, Boner AL. Prevalence and risk factors for atopic dermatitis in preschool children. *Br J Dermatol*. 2008;158:539-43.
26. Gustafsson D, Sjöberg O, Foucard T. Sensitization to food and airborne allergens in children with atopic dermatitis followed up to 7 years of age. *Pediatr Allergy Immunol*. 2003;14:448-52.
27. Uekert SJ, Akan G, Evans MD, Li Z, Roberg K, Tisler C, et al. Sex-related differences in immune development and the expression of atopy in early childhood. *J Allergy Clin Immunol*. 2006;118:1375-81.
28. Duncan JM, Sears MR. Breastfeeding and allergies: Time for a change in paradigm? *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2008;8:398-405.
29. Wegienka G, Ownby DR, Havstad S, Williams LK, Johnson CC. Breastfeeding history and childhood allergic status in a prospective birth cohort. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2006;97:78-83.
30. Kramer MS, Matush L, Vanilovich I, Platt R, Bogdanovich N, Sevkovskaya Z, et al. Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (Probit) Study Group. Effect of prolonged and exclusive breast feeding on risk of allergy and asthma: Cluster randomized trial. *BMJ*. 2007;335:815-20.
31. Kulig M, Luck W, Lau S, Niggemann B, Bergmann R, Klettke U, et al. Effect of pre- and postnatal tobacco smoke exposure on specific sensitization to food and inhalant allergens during the first 3 years of life. Multicenter Allergy Study Group, Germany. *Allergy*. 1999;54:220-8.
32. Strachan DP, Cook DG. Health effects of passive smoking. 5. Parental smoking and allergic sensitisation in children. *Thorax*. 1998;53:117-23.
33. Simpson A, Custovic A. Pets and the development of allergic sensitization. *Curr Allergy Asthma Rep*. 2005;5:212-20.
34. Weiland SK, Hüsing A, Strachan DP, Rzehak P, Pearce N, and the ISAAC Phase One Study Group. Climate and the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinitis, and atopic eczema in children. *Occup Environ Med*. 2004;61:609-15.
35. Carvajal Urueña I, García-Marcos L, Busquets Monge R, Morales Suárez-Varela M, García de Andoin N, Batlles Garrido J, et al. Variaciones geográficas en la prevalencia de síntomas de asma en los niños y adolescentes españoles. International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) fase III España. *Arch Bronconeumol*. 2005;41:659-66.
36. Morales Suárez-Varela M, García-Marcos L, González Díaz C, Arnedo Pena A, Domínguez Aurrecochea B, Busquet Monge R, et al. Prevalencia de dermatitis atópica y factores nutricionales en niños de 6-7 años. *Aten Primaria*. 2007;39:355-60.
37. García-Marcos L, García-Hernández G, Morales Suarez-Varela M, Batlles Garrido J, Castro-Rodríguez JA. Asthma attributable to atopy: Does it depend on the allergen supply? *Pediatr Allergy Immunol*. 2007;18:181-7.
38. Sandin A, Annus T, Björkstén B, Nilsson L, Riiikjær MA, Van Hage-Hamsten M, et al. Prevalence of self-reported food allergy and IgE antibodies to food allergens in Swedish and Estonian schoolchildren. *Eur J Clin Nutr*. 2005;59:399-403.