

6. Schwabova J, Brozkova DS, Petrak B, Mojzisova M, Pavlickova K, Haberlova J, et al. Homozygous *EXOSC3* mutation c.92G→C, p.G31A is a founder mutation causing severe pontocerebellar hypoplasia type 1 among the Czech Romani. *J Neurogenet.* 2013;27:163–9.

Anna Paola Di Giovambattista\*, Itxaropena Jácome Querejeta, Purificación Ventura Faci, Gerardo Rodríguez Martínez y Feliciano Ramos Fuentes

*Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, , Zaragoza, España*

\* Autor para correspondencia.  
Correo electrónico: [annadigiov@live.it](mailto:annadigiov@live.it)  
(A.P. Di Giovambattista).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2016.09.011>  
1695-4033/

© 2016 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

## Uso de levetiracetam en crisis convulsivas neonatales



### Use of levetiracetam in neonatal seizures

Sra. Editora:

Las convulsiones neonatales (CN) afectan a 1,5 de cada 1.000 recién nacidos, siendo más frecuentes en prematuros. Suelen deberse principalmente a asfixia, hemorragias, malformaciones cerebrales, alteraciones electrolíticas, errores congénitos del metabolismo o infecciones<sup>1</sup>. A la dificultad para su diagnóstico y la decisión de a qué niños tratar, se une la cada vez mayor evidencia de efectos deletéreos de las medicaciones aprobadas para este fin: fenobarbital y fenitoína. Ambas consiguen reducir las crisis en menos del 50% de los casos, y se asocian a apoptosis neuronal en modelos animales. Por ello, cada vez se usan más otros fármacos, fuera de ficha técnica, con menos efectos secundarios aparentes. El levetiracetam (LEV) fue aprobado por la FDA en 2012<sup>2</sup> para el uso en convulsiones parciales a partir del mes de vida.

Revisamos el uso de LEV en neonatos hospitalizados en nuestra unidad, desde enero de 2011 a mayo de 2016. Las características de los pacientes aparecen en la [tabla 1](#). Se trataron 23 recién nacidos, con un peso entre 1.610-4.100 g, siendo el 17,4% prematuros. Los tipos de crisis, pruebas complementarias y resultados están reflejados en la [tabla 2](#).

Se usó como primera opción terapéutica en el 17,4% de los casos, siendo la segunda opción en el 73,9%, mayoritariamente tras fenobarbital. En 15 casos (65,2%) se usó una dosis de carga intravenosa, ente 10-50 mg/kg. Se usó dosis de mantenimiento en el 91,3%, entre 10-40 mg/kg/2 dosis, con aumento de 10 mg/kg/3-5 días. De los 19 casos en los que se usó como segunda opción, se consiguió la reducción del primer medicamento en el 63,1% en la primera semana tras el inicio de LEV. En 8 casos no mejoraron las crisis clínicas o eléctricas en las primeras 24h, pero en 15 (65,2%) sí mejoraron (entendiendo mejoría como cese de las crisis o reducción al menos al 50% de frecuencia). No se identificaron efectos adversos en ningún caso. En 4 casos se realizó limitación del esfuerzo terapéutico, sin relación con el uso de LEV. De los 19 restantes, el 88,9% fueron dados de alta con LEV (77,8% en monoterapia).

El uso de LEV en las CN es cada vez más frecuente, pese a no estar aprobado su uso, como la mayoría de fármacos antiepilépticos en lactantes. Se recomienda más por parte de neuropediatras que de neonatólogos<sup>1,2</sup>. Un estudio<sup>3</sup> encontró retrospectivamente, 72 neonatos tratados con LEV, siendo la mayoría prematuros, sin encontrar efectos secundarios que interrumpieran el tratamiento. El criterio de crisis fue únicamente clínico, ya que no se usó aEEG o EEG, por lo que los resultados de eficacia son discutibles. Estudios previos han reclutado entre 6 y 38 neonatos<sup>2</sup>, algunos solo con prematuros (n = 12)<sup>4</sup>. Un estudio prospectivo<sup>5</sup>, de 38 neonatos, con uso de LEV como primera opción, encontró mejoría clínica, y en EEG a la semana de vida en 30 de ellos, sin efectos secundarios, aunque permitió 2 dosis de fenobarbital mientras se incrementaban gradualmente las dosis de LEV, por lo que el fenobarbital o la propia evolución de las crisis pudieron influir en los resultados. Se ha comunicado un caso de *shock* anafiláctico tras la infusión de LEV en un neonato<sup>6</sup>, y es posible que en niños con situaciones clínicas complejas y con mediación previa no sean fáciles de detectar. Recientemente se ha asociado el LEV a la apoptosis neuronal en asfixias no tratadas con hipotermia<sup>6</sup>. Dada la escasez de trabajos en neonatos, aún no es posible determinar la seguridad de este fármaco como primera opción en el tratamiento de las CN, y la mayoría de las guías actuales que incluyen el LEV lo relegan a una segunda opción.

Esta revisión tiene limitaciones. Además de ser retrospectiva, el número de casos es pequeño, aunque no hemos encontrado ninguna publicación española sobre el tema; no disponemos de vídeo-EEG para el diagnóstico de las crisis, aunque se ha usado el aEEG y el EEG para guiar el tratamiento. Un mayor número de casos podría determinar si la edad gestacional o la causa de las crisis tiene relación con la respuesta a LEV.

En conclusión, el LEV es cada vez más usado en las CN, en general como segundo fármaco. Parece tener una efectividad al menos similar a los antiepilépticos clásicos. Los escasos efectos secundarios encontrados y el menor daño cerebral que parece tener, hace del LEV un fármaco a considerar, incluso en prematuros. Son necesarios estudios prospectivos para conocer los efectos a corto y largo plazo de esta medicación.

Esta revisión tiene la conformidad del comité de ética hospitalaria.

**Tabla 1** Características de los pacientes

Casos	Edad gestacional/ sexo	Peso al nacimiento (g)	Apgar 1-5 min	Días de vida al ingreso	Etiología	Orden de uso	Indicación	Vía inicial	Dosis de carga	Dosis de mantenimiento máxima en el hospital	Días de ingreso uso LEV	Mejoría de respuesta a las 24 h	Días de tratamiento hospitalario	Tratamiento al alta	Efectos adversos
1	41/M	3.000	9-10	2	Hemorragia cerebral	2	No cede con FB	iv	40 mg/kg	No	2	No	1	FB	No
2	39/v	3.337	4-6	7	Asfixia	1	Crisis	Oral		30 mg/kg en 2 dosis oral	3	Sí	6	LEV	No
3	38/M	2.420	9-10	25	Malformación cerebral	1	Crisis	iv	10 mg/kg	35 mg/kg en 2 dosis oral	3	Sí	66	LEV, FB	No
4	38/v	3.200	1-4	1	Asfixia	2	No cede con FB	iv	30 mg/kg	No	1	No	1	No	No
5	35/M	2.154	0-0	1	Asfixia	2	No cede con FB	iv	20 mg/kg	10 mg/kg iv	1	No	2	Muerte	No
6	40/v	3.100	9-10	15	Asfixia extrahospitalaria	2	No cede con FB	iv	10 mg/kg	20 mg/kg en 2 dosis oral	1	Sí	6	LEV	No
7	39/v	3.591	5-8	1	Asfixia	2	No cede con FB	iv	20 mg/kg	40 mg/kg/día en 2 dosis oral	2	No	8	LEV	No
8	39/v	4.100	9-10	1	Malformación cerebral	2	Paso a LEV	Oral		60 mg/kg/día en 2 dosis	2	Sí	23	LEV, VAL	No
9	34/M	2.415	0-4	1	Asfixia	2	No cede con FB	iv	50 mg/kg	40 mg/kg/día en 2 dosis	1	No	45	LEV	No
10	38/M	2.935	1-3	1	Asfixia	3	No cede con FB	iv	10 mg/kg	10 mg/kg iv	3	Sí	5	Muerte	No
11	40/v	3.650	7-9	2	Idiopática	2	No cede con FB	iv	40 mg/kg	60 mg/kg/día en 2 dosis	5	No	40	LEV	No
12	40/M	3.400	3-7	1	Asfixia	2	No cede con FB	iv	20 mg/kg	40 mg/kg/día en 2 dosis	1	Sí	11	LEV	No
13	34/M	2.230	7-8	1	Idiopática	1	Crisis	Oral		20 mg/kg/día en 2 dosis oral	3	Sí	5	LEV	No
14	39/M	3.200	9-10	3	Infarto arterial	1	Crisis	Oral		10 mg/kg oral en 2 dosis	7	Sí	5	LEV	No
15	37/M	1.610	6-9	1	Sindrómico	2	Paso a LEV	Oral		30 mg/kg en 2 dosis oral	6	Sí	29	LEV	No
16	39/v	2.500	9-10	8	Malformación cerebral	2	Paso a LEV	Oral		30 mg/kg en 2 dosis oral	3	Sí	25	LEV	No
17	41/M	3.900	9-10	9	Hemorragia cerebral	2	No cede con FB	iv	10 mg/kg	10 mg/kg iv	1	Sí	2	Muerte	No
18	37/M	2.120	9-9	1	Hipoglucemia	2	No cede con FB	iv	10 mg/kg	35 mg/kg en 2 dosis oral	2	No	11	LEV	No
19	37/v	3.000	9-10	20	Meningitis neumocócica	2	No cede con FB	iv	15 mg/kg	20 mg/kg iv	1	No	10	Muerte	No
20	41/v	3.890	9-10	3	Malformación cerebral	2	No cede con FB	iv	10 mg/kg	10 mg/kg oral en una dosis	4	Sí	7	LEV	No
21	39/v	3.200	9-10	4	Idiopática	2	No cede con FB	iv	20 mg/kg	30 mg/kg en 2 dosis oral	2	Sí	10	FEN, OXC	No
22	41/v	3.490	9-10	1	Idiopática	5	Paso a LEV	Oral		25 mg/kg en 2 dosis	15	Sí	5	LEV	No
23	35/v	3.680	3-6	1	Asfixia	2	Paso a LEV	Oral		30 mg/kg en 2 dosis oral	6	Sí	13	LEV	No

FB: fenobarbital; FEN: fenitoina; M: mujer; LEV: levetiracetam; OXC: oxcarbazepina; v: varón; VAL: ácido valproico.

**Tabla 2** Características de las crisis y pruebas diagnósticas

	N.º (%)
<i>Tipos de crisis</i>	
Clónicas	21 (91,2)
Solo sutiles	1 (4,4)
Tónicas	1 (4,4)
<i>Causas</i>	
Asfixia	9 (39,1)
Malformación cerebral	5 (21,7)
Hemorragias	3 (13)
Idiopática	3 (13)
Infecciones	1 (4,4)
Metabólicas	1 (4,4)
Hipoglucemia	1 (4,4)
<i>RMN con difusión</i>	21 (91,2)
RMN patológica	15 (71,4)
<i>Solo ecografía cerebral</i>	
Patológica	2 (8,8)
<i>EEG*</i>	21 (91,2)
Crisis	17 (81)
Solo alteración patrón de fondo	4 (19)
<i>EEG</i>	22 (95,6)
Patológico	14 (63,6)

EEG: electroencefalograma; RMN: resonancia magnética nuclear.

EEG\* Electroencefalograma integrado por amplitud.

- Mruk AL, Garlitz KL, Leung NR. Levetiracetam in neonatal seizures: A review. *J Pediatr Pharmacol Ther.* 2015;20:76–89.
- Neininger MP, Ullmann M, Dahse AJ, Syrbe S, Bernhard MK, Frontini R, et al. Use of levetiracetam in neonates in clinical practice: A retrospective study at a German university hospital. *Neuropediatrics.* 2015;46:329–34.
- Khan O, Cipriani C, Wright C, Crisp E, Kirmani B. Role of intravenous levetiracetam for acute seizure management in preterm neonates. *Pediatr Neurol.* 2013;49:340–3.
- Koklu E, Ariguloglu EA, Koklu S. Levetiracetam-induced anaphylaxis in a neonate. *Pediatr Neurol.* 2014;50:192–4.
- Griesmaier E, Stock K, Medek K, Stanika RI, Obermair GJ, Posod A, et al. Levetiracetam increases neonatal hypoxic-ischemic brain injury under normothermic, but not hypothermic conditions. *Brain Res.* 2014;1556:10–8.

Jose Maria Lloreda-García\*, Jose Ramón Fernández-Fructuoso, Elisabeth Gómez-Santos, Ana García-González y Jose Luis Leante-Castellanos

*Unidad de Neonatología y UCI Neonatal, Hospital Universitario Santa Lucía, Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, Cartagena, Murcia, España*

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [jmlloreda@gmail.com](mailto:jmlloreda@gmail.com)  
(J.M. Lloreda-García).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2016.08.004>  
1695-4033/

© 2016 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

## Bibliografía

- Hellström-Westas L, Boylan G, Ågren J. Systematic review of neonatal seizure management strategies provides guidance on anti-epileptic treatment. *Acta Paediatr.* 2015;104:123–9.